

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill  
**Заявка № 18045005 Назва сорту:** Дара **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 12.02.2020  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200455**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від напівпрямого до горизонтального	4	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвій оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час достигання	ранній	3	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	2,32	2,08
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,01	3,16	3,02
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,42	0,84	0,94
+,- до усередненої урожайності, %	26,6	36,3	45,1
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, днів	117	115	120
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	131,1	179,5	176,5
Висота рослини, см	64	80,7	94,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,2	13,5	12,4
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	8	9
Вміст білка, %	32,8	37,9	33,6
Вміст олії, %	24,8	22,4	24,1
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	нбіл, вл	сбіл, вл	нбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.