

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill**Заявка № 17045062 Назва сорту:** Жаклін**Заявник (код):** 1626**Власник сорту (код):** 1626**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 05.02.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200453****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

Nº	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гілокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гілокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушенні головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінінна: розмір	середній	5	
14	Насінінна: форма	видовжено-плескаті	4	
15	Насінінна: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінінна: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінінна: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінінна: забарвлення см'яніжки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягнення	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,71	2,96	2,42
+ - до усередненої урожайності, т/га	0,03	0,67	0,54
+ - до усередненої урожайності, %	2	29,1	28,6
Довгочасний інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	104	99	112
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	117,5	152,3	139
Висота рослини, см	61,9	69,4	85,5
Висота прикріplення нижнього бобу, см	9,4	11,8	13
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	34,1	39,2	35,6
Вміст олії, %	23,1	20,5	21,7
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Якість	нбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.