

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill**Заявка № 18045008 Назва сорту:** Маріем**Заявник (код):** 2264**Власник сорту (код):** 2264**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 12.03.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200456****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гілокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гілокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушенні головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінінна: розмір	середній	5	
14	Насінінна: форма	видовжено-плескаті	4	
15	Насінінна: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінінна: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінінна: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінінна: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час досягнення	від раннього до середнього	4	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	2,27	
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,93	3,19	
+/- до усередненої урожайності, т/га	0,34	0,92	
+/- до усередненої урожайності, %	21,2	40,5	
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	
Тривалість періоду вегетації, діб	130	115	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	142,5	189,8	
Висота рослини, см	70,6	71,4	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,1	10,2	
Стійкість до вилігання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	8	
Вміст білка, %	37,1	40,3	
Вміст олії, %	23,3	21,7	
Блок (Група стигlosti)	8	8	
Напрям використання	зерн	зерн	
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**