

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill  
**Заявка № 18045018 Назва сорту:** Сіберія **Заявник (код):** 142 **Власник сорту (код):** 142  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 25.02.2020  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200459**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричнєве	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	2,32	2,08
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,51	2,45	2,69
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,08	0,13	0,61
+,- до усередненої урожайності, %	-5,1	5,5	29,2
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, днів	114	106	113
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	153	184,3	173,6
Висота рослини, см	61,8	69,7	79
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,8	10,4	13,4
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	8
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	34,2	39,7	36
Вміст олії, %	24,4	20,8	22,5
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	нбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.