

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045059 Назва сорту: Тіваз Заявник (код): 2430 Власник сорту (код): 2430

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200450

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,45	2,91	2,74
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,23	0,62	0,86
+,- до усередненої урожайності, %	-13,8	27	46
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	102	107	114
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	143,3	212	182
Висота рослини, см	54,8	67,1	84,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,6	10,3	12,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	8	9
Вміст білка, %	37,8	40,8	35,7
Вміст олії, %	24	21,9	23,9
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.