

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays L.*

Заявка № 15009047 Назва сорту: Асіст Заявник (код): 1902 Власник сорту (код): 1902

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180092

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №    | Ознака  | Проявлення                 | Код |
|------|---|----------------------------|-----|
| 1    | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви  | сильне                     | 7   |
| 2    | Перший листок: форма верхівки   | округла                    | 3   |
| 3    | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення  | помірна                    | 2   |
| 4    | Листок: хвильистість краю пластинки   | помірна                    | 2   |
| 5    | Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом  | малий                      | 3   |
| 6    | Листок: положення пластинки у просторі  | ледь похиле                | 3   |
| 7    | Стебло: зигзагоподібність   | відсутня або дуже слабка   | 1   |
| 8    | Волоть: час цвітіння  | від раннього до середнього | 4   |
| 9    | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски   | слабке                     | 3   |
| 10   | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи   | слабке                     | 3   |
| 11   | Волоть: антоціанове забарвлення піляків   | помірне                    | 5   |
| 12   | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками   | малий                      | 3   |
| 13   | Волоть: положення бічних гілочок у просторі   | пряме                      | 1   |
| 14   | Волоть: кількість первинних бічних гілочок  | відсутні або дуже мала     | 1   |
| 15   | Качан: час появи шовку  | середній                   | 5   |
| 16   | Качан: антоціанове забарвлення шовку  | слабке                     | 3   |
| 17   | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів  | помірне                    | 5   |
| 18   | Волоть: розташування колосків за щільністю  | нечільне                   | 3   |
| 19   | Листок: антоціанове забарвлення піхви   | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 20   | Стебло: антоціанове забарвлення міжузлів  | помірне                    | 5   |
| 21   | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)   | середня                    | 5   |
| 22   | Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)  | коротка                    | 3   |
| 23   | Волоть: бічна гілочка за довжиною   | середня                    | 5   |
| 24,1 | Лише для інбридингових ліній та сортів з цукровим або розлускним типом зерна. Рослина: за довжиною                                    | ознака не визначається     | 0   |
| 24,2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлускним типом зернівки. Рослина: за довжиною | довга                      | 7   |
| 25   | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини  | мале                       | 3   |
| 26   | Листок: пластинка за ширину   | середня                    | 5   |
| 27   | Качан: ніжка за довжиною  | середня                    | 5   |
| 28   | Качан: за довжиною  | середній                   | 5   |
| 29   | Качан: діаметр (посередині)   | великий                    | 7   |
| 30   | Качан: форма  | конусно-циліндрична        | 2   |
| 31   | Качан: кількість зернових рядів   | мала                       | 3   |
| 32   | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвень зерен  | ознака не визначається     | 0   |
| 33   | Лише для сортів з цукровим типом зернівки: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору  | ознака не визначається     | 0   |
| 34   | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною  | ознака не визначається     | 0   |
| 35   | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за ширину  | ознака не визначається     | 0   |
| 36   | Качан: тип зернівки   | кременистоподібний         | 2   |
| 37   | Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок   | ознака не визначається     | 0   |
| 38   | Качан: забарвлення верхівки зернівки  | жовте                      | 3   |
| 39   | За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок  | жовто-оранжеве             | 4   |
| 40   | Лише для сортів з розлускним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення  | ознака не визначається     | 0   |
| 41   | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня  | відсутнє або дуже слабке   | 1   |

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник  | Значення |       |       |
|---|----------|-------|-------|
|   | С        | Л     | П     |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 51,7     | 77,4  | 72,5  |
| Довірчий інтервал, ц/га (+)   | 0,8      | 0,6   | 0,7   |
| урожайність, ц/га   | 38,0     | 78,0  | 66,6  |
| + - до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га                                      | -13,7    | 0,5   | -5,9  |
| + - до усередненого значення за 5 попередніх років, %   | -26,0    | 1,0   | -8,0  |
| Тривалість періоду вегетації, діб   | 113      | 114   | 125   |
| Висота рослини, см  | 195,5    | 233,5 | 225,8 |
| Висота прикріплення нижнього качана, см   | 81,2     | 78,2  | 90,1  |
| Вихід зерна, %  | 81,8     | 78,7  | 80,3  |
| Стійкість до посухи, бал  | 7        | 8     | 8     |
| Стійкість до вилягання, бал   | 8        | 8     | 9     |
| Стійкість проти пухирчастої сажки, бал  | 9        | 9     | 9     |
| Вміст білка, %  | 10,4     | 9,8   | 9,8   |
| Вміст крохмалю, %   | 70,8     | 71,3  | 71,5  |
| Напрям використання: зерновий   |          |       |       |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.