

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 17022006 Назва сорту: Аристократ **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200468

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	гексаплоїд	6	
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	слабкий	3	
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	сильне	7	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: кільвий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	відсутній або дуже малий	1	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	2	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	напівбулавоподібний	3	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	горбата	9	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	дрібна	3	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,58	4,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		6,01	5,92
+,- до усередненої урожайності, т/га		0,43	1,3
+,- до усередненої урожайності, %		7,7	28,2
Довірчий інтервал, т/га		0,21	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб		281	277
Висота рослини, см		92,9	108,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		48,2	41,6
Череззерниця, %		7,5	7,2
Вміст білка, %		12,4	13,1
Вміст морозобійних зерен, %		0	0
Стійкість до вилягання, бал		8	7
Стійкість до обсіпання, бал		8	8
Стійкість до посухи, бал		9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	7
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	8
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	8
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.