

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 17022005 Назва сорту: Солодюк **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200467

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	гексаплоїд	6	
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	помірне	5	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	середня	5	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	пізніє	7	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	слабке	3	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска: кільцевий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	дуже короткий	1	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	стро-димчасте	2	
22	Колос: за щільністю	щільний	7	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	напівбулавоподібний	3	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	горбата	9	
33	Зернівка: забарвлення	коричневе	5	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,58	4,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		5,56	5,14
+/- до усередненої урожайності, т/га		-0,02	0,52
+/- до усередненої урожайності, %		-0,3	11,2
Довірчий інтервал, т/га		0,21	0,17
Тривалість періоду вегетації, дів		282	294
Висота рослини, см		89,1	99,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		48,9	38,3
Череззерниця, %		11	8,8
Вміст білка, %		13	13,2
Вміст морозобійних зерен, %		0	0
Стійкість до вилягання, бал		9	7
Стійкість до обсіпання, бал		9	8
Стійкість до посухи, бал		8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	8
Стійкість проти борошністої роси, бал		9	9
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	8
Стійкість проти корневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		8	8
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.