

**Вид:** Боби кінські *Vicia faba* L. var. *minor*

**Заявка №** 18094001 **Назва сорту:** Аполло **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 02.03.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200213

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листя: забарвлення	помірно зелене	2	
2	Час цвітіння (50% рослин хоча б з однією квіткою)	середній	5	
3	Лише для сортів з меланіною плямою. Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
4	Листочок: за довжиною (базальна пара листочків другого квіткового вузла)	середній	5	
5	Листочок: за шириною	вузький	3	
6	Листочок: місце максимальної ширини	посередині	2	
7	Квітка: за довжиною	коротка	3	
8	Крило: меланінова пляма	наявна	9	
9	Крило: забарвлення меланінової плями	чорне	2	
10	Парус: антоціанове забарвлення	наявне	9	
11	Парус: поширення антоціанового забарвлення	середнє	5	
12	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
13	Рослина: за висотою	висока	7	
14	Стебло: кількість вузлів (до першого квіткового вузла включно)	велика	7	
15	Біб: за довжиною (без дзьобика)	короткий	3	
16	Біб: за шириною (від шва до шва)	вузький	3	
17	Суша насінина: форма поздовжнього розрізу	еліптична	2	
18	Суша насінина: маса 100 насінин	середня	5	
19	Суша насінина: забарвлення насіннєвої шкірки (відразу після збирання)	бежеве	1	
20	Суша насінина: чорна пігментація рубчика	відсутня	1	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння, т/га – 5,2. Урожайність зеленої маси, т/га – 55. Вміст білка в зеленій масі, % – 27. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб: бактеріоз (*Bacterium phaseoli* E.F. Sm.), бал (1–9) – 9; фузаріоз (*Fusarium oxysporum* Sch.), бал (1–9) – 7; аскохітоз (*Ascochyta viciae* Libert.), бал (1–9) – 5; смугаста плямистість (*Bacterium lathyri* (Mann. et Taub.) Burgw.), бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників: бобова зернівка (*Bruchus rufimanus* Voh.), бал (1–9) – 5; бобова (акацієва) вогнівка (*Etiella zinckenella* Tr.), бал (1–9) – 5; бобовий стеблоїд (*Lixus algirus* L.), бал (1–9) – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.