

Вид: Боби кінські *Vicia faba* L. var. *minor*

Заявка № 18094002 Назва сорту: Бірґіт **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.03.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200214

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листя: забарвлення	помірно зелене	2	
2	Час цвітіння (50% рослин хоча б з однією квіткою)	середній	5	
3	Лише для сортів з меланіновою плямою. Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
4	Листочок: за довжиною (базальна пара листочків другого квіткового вузла)	середній	5	
5	Листочок: за шириною	широкий	7	
6	Листочок: місце максимальної ширини	посередині	2	
7	Квітка: за довжиною	середня	5	
8	Крило: меланінова пляма	наявна	9	
9	Крило: забарвлення меланінової плями	чорне	2	
10	Парус: антоціанове забарвлення	наявне	9	
11	Парус: поширення антоціанового забарвлення	середнє	5	
12	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
13	Рослина: за висотою	середня	5	
14	Стебло: кількість вузлів (до першого квіткового вузла включно)	середня	5	
15	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5	
16	Біб: за шириною (від шва до шва)	середній	5	
17	Суша насінина: форма повздовжнього розрізу	неправильної форми	3	
18	Суша насінина: маса 100 насінин	середня	5	
19	Суша насінина: забарвлення насінневої шкірки (відразу після збирання)	бежеве	1	
20	Суша насінина: чорна пігментація рубчика	наявна	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння, т/га – 5. Урожайність зеленої маси, т/га – 60. Вміст білка в зеленій масі, % – 27. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб: бактеріоз (*Bacterium phaseoli* E.F. Sm.), бал (1–9) – 9; фузаріоз (*Fusarium oxysporum* Sch.), бал (1–9) – 7; аскохітоз (*Ascochyta viciae* Libert.), бал (1–9) – 6; смугаста плямистість (*Bacterium lathyri* (Mann. et Taub.) Burgw.), бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників: бобова зернівка (*Bruchus rufimanus* Voh.), бал (1–9) – 5; бобова (акацієва) вогнівка (*Etiella zinckenella* Tr.), бал (1–9) – 5; бобовий стеблоїд (*Lixus algirus* L.), бал (1–9) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.