

Вид: Костриця червона *Festuca rubra* L.**Заявка № 16282006 Назва сорту:** Вагнер 1 **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 12.03.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200232****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	гексаплоїд	6	
2	Піхва листка: антоціанове забарвлення	помірне	5	
3	Рослина: за природною висотою	середня	5	
4	Рослина: габітус	проміжний	5	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Лиші для сортів костриці червоної. Листок: за ширину	середній	5	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
8	Листок: сизий наліт	відсутній	1	
9	Рослина: формування кореневища	відсутнє або слабке	1	
10	Рослина: час появи суцвіття	ранній	3	
11	Рослина: за природною висотою під час появи суцвіття (прапорцевий листок не враховують)	середня	5	
12	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5	
13	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за ширину	вузький	3	
14	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина/ширина	велике	7	
15	Рослина: найдовше стебло за довжиною (суцвіття включено)	довге	7	
16	Рослина: верхнє міжвузля за довжиною	довге	7	
17	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
18	Суцвіття: антоціанове забарвлення волоті	помірне	5	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,16. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 3. Вміст білка у сухій речовині, % – 14; клітковини у сухій речовині, % – 35. Висота рослин, см – 75. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стигlosti, діб – 85. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 1,1. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; сажка – 7; стеблова іржа – 7; антракноз – 8; снігова пліснява – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.