

Вид: Люпин білий *Lupinus albus* L.

Заявка № 17197001 Назва сорту: Барвінок Заявник (код): 1626 Власник сорту (код): 1626

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200364

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: гірка речовина	ознака не визначається	0	
2	Рослина: за висотою у вегетативній стадії	низька	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення до фази бутонізації	слабка	3	
4	Стебло: антоціанове забарвлення до фази бутонізації	помірне	5	
5	Час цвітіння	середній	5	
6	Рослина: за висотою у фазі початку цвітіння	низька	3	
7	Центральний листок: за довжиною	довгий	7	
8	Центральний листок: за шириною	широкий	7	
9	Квітка: забарвлення крил	синювато-біле	2	
10	Квітка: забарвлення кінчика човника	синьо-чорне	2	
11	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
12	Біб: час настання зеленої стиглості	середній	5	
13	Рослина: за висотою прикріплення першого суцвіття, за зеленої стиглості (від поверхні ґрунту до першого суцвіття)	середня	5	
14	Рослина: за висотою у зеленій стиглості	висока	7	
15	Біб: за довжиною	довгий	7	
16	Час досягання	пізній	7	
17	Насінина: орнаментация	відсутня	1	
18	Насінина: забарвлення орнаментации	ознака не визначається	0	
19	Насінина: розподіл орнаментации	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів з бровою. Насінина: щільність орнаментации	ознака не визначається	0	
21	Насіння: маса 100 шт.	велика	7	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га		46,8	68,6
Довірчий інтервал, ц/га (±)		10,9	16,3
Урожайність, ц/га		38,5	78
+,- до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га		-8,3	9,4
+,- до усередненого значення за п'ять попередніх років, %		-18	14
Урожайність насіння, ц/га		30,9	22,5
Тривалість періоду вегетації, діб		64	66
Стійкість до вилягання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти антракнозу, бал		8	9
Стійкість проти сірої гнилі, бал		8	9
Залистяність, бал		61,1	67,7
Вміст сирого протеїну, бал		21,8	20,6
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.