

**Вид:** Горіх грецький *Juglans regia* L.

**Заявка № 19284001 Назва сорту:** Дніпро **Заявник (код):** 2565 2566 **Власник сорту (код):** 2565 2566

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.02.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200219**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	слабке	3	
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2	
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня	5	
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок	уздовж однорічного пагона (плодоношення на бічних плодкових пагонах)	3	
5	Однорічний пагін: забарвлення	світло-коричневе	2	
6	Листок: форма бічних листочків	еліптична	5	
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	середня	5	
8	Горіх: розмір	дуже малий	1	
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	округла	1	
10	Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва	округла	1	
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	округла	2	
12	Горіх: коефіцієнт округлості	високий	7	
13	Горіх: форма основи перпендикулярно до шва	округла	2	
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	округла	2	
15	Горіх: виступ апікального кінчика	слабкий	3	
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	у верхній половині	1	
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	слабка	3	
18	Горіх: «сідельце» на шві за шириною	середнє	5	
19	Горіх: боріздка вздовж «сідельця» на шві за глибиною	мілка	3	
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	слабко борозенчаста	1	
21	Горіх: шкаралупа за товщиною	дуже тонка	1	
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	слабка	3	
23	Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною	тонкі	3	
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	дуже легко	1	
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	слабка	3	
26	Ядро: розмір	малий	3	
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	велике	7	
28	Час достигання	середній	5	
29	Час початку листопаду	середній	5	
30	Листок: стійкість до опадання	стійкий	2	
31	Оплодень: стійкість до опадання	частково стійкий	2	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	від раннього до середнього	4	
33	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5	
34	Час цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	одночасно (гомогамний)	2	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Середня врожайність, т/га – 5,72. Середній урожай з дерева, кг – 20,0. Середня маса плоду, г – 10,2. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Настання знімальної стиглості, діб – 140. Виповненість горіха, бал (1–9) – 8. Твердість шкаралупи, бал (1–9) – 8. Вихід ядра, % – 60,0. Легкість видалення ядра, бал (1–9) – 9. Вміст жиру, % – 68,5; білка, % – 16,5; вуглеводів, % – 7,5. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіхова попелиця – 8; горіхова міль – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість – 8; чорна плямистість – 9. Група достигання – сс.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.