

Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch

Заявка № 16259001 Назва сорту: Вогник **Заявник (код):** 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.12.2019 **Патент № 190865**

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: розмір	середній	5	
2	Дерево: за силою росту	середнє	5	
3	Дерево: габітус	розлогий	3	
4	Квітконосний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	нешільне	3	
9	Квітка: тип	дзвоникоподібний	1	
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	рожеве	4	
11	Пелюстка: форма	вузькоюяцеподібна	1	
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	середня	3	
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0	
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1	
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	вище	3	
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	вище	3	
17	Пиляки: пилочок	наявний	9	
18	Зав'язь: опушення	наявне	9	
19	Прилистки: за довжиною	короткі	3	
20	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
24	Листкова пластинка: форма краю	городчаста	1	
25	Листкова пластинка: кут основи	тупий	3	
26	Листкова пластинка: кут верхівки	середній	5	
27	Листкова пластинка: забарвлення	темно-зелене	4	
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	відсутнє	1	
29	Черешок: за довжиною	середній	5	
30	Черешок: нектарники	наявні	9	
31	Черешок: форма нектарників	ниркоподібна	2	
32	Плід: розмір	середній	5	
33	Плід: форма (вигляд збоку)	еліптична	5	
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1	
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	плоска	3	
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	сильно асиметричний	3	
37	Плід: помітність шва	слабка	3	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5	
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	середня	5	
40	Плід: основне забарвлення шкірки	оранжево-жовте	11	
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	дуже велика	9	
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	чорнувато-червоний	7	
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	суцільний рум'янець	1	
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9	
45	Плід: щільність опушення шкірки	щільне	7	
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глянуватість	ознака не визначається	0	
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0	
48	Плід: шкірка за товщиною	середня	5	
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	помірно	5	
50	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжеве	7	
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	сильне	3	
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	сильне	3	
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	сильне	3	
55	Плід: волокнистість м'якоті	відсутня або слабка	1	
56	Плід: цукристість	низька	3	
57	Плід: кислотність	помірна	3	
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	середній	5	
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	оберненояцеподібна	4	
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
62	Кісточка: рельєфність поверхні	порівну ямки і борідки	3	
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	сильна	7	
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	відсутнє	1	
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	ознака не визначається	0	
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
67	Час початку цвітіння	середній	5	
68	Час споживчої стиглості	від дуже раннього до раннього	2	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 29,0. Середній урожай з дерева, кг – 35,0. Уміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 12,27; загального цукру, % – 5,56; фенольних сполук, мг/100 г сирової речовини – 30,0; пектинових речовин, мг/100 г сирової речовини – 0,2; сухих розчинних речовин, % – 9,87. Загальна кислотність, % – 0,88. Маса плоду (середня), г – 80,0. Маса плоду (максимальна), г – 88,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 9; моніліальний опік – 7; парша – 8; клястероспоріоз – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кісточкова муха – 7; попелиця – 9. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Зимостійкість, балів (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 × 4. Група стиглості – рс. Напрямок використання – ун. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.