

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045003 Назва сорту: Майя Заявник (код): 2484 Власник сорту (код): 2484

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.04.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200627

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,86	2,24	1,91
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,16	2,62	2,32
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,7	0,38	0,41
+, - усередненої урожайності, %	-37,6	16,8	21,6
Довірчий інтервал, т/га	1,1	1,0	0,7
Тривалість періоду вегетації, дб	95	103	112
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	137,9	188,9	169,2
Висота рослини, см	57,6	77,1	87,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,1	11,1	16,4
Стійкість до вилягання, бал	9	7	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	6	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	40,3	42,1	40,2
Вміст олії, %	23,7	22,0	22,9
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.