

**Вид:** Боби кінські *Vicia faba* L. var. *minor*

**Заявка № 18094005 Назва сорту:** Алексія **Заявник (код):** 2524 2436 **Власник сорту (код):** 2524 2436

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.04.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200537**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листя: забарвлення	темно-зелене	3	
2	Час цвітіння (50% рослин хоча б з однією квіткою)	середній	5	
3	Лише для сортів з меланіновою плямою. Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
4	Листочок: за довжиною (базальна пара листочків другого квіткового вузла)	середній	5	
5	Листочок: за ширину	широкий	7	
6	Листочок: місце максимальної ширини	ближче до основи	3	
7	Квітка: за довжиною	середня	5	
8	Крило: меланінова пляма	наявна	9	
9	Крило: забарвлення меланінової плями	чорне	2	
10	Парус: антоціанове забарвлення	наявне	9	
11	Парус: поширення антоціанового забарвлення	середнє	5	
12	Рослина: тип росту	індегермінантний	2	
13	Рослина: за висотою	середня	5	
14	Стебло: кількість вузлів (до першого квіткового вузла включно)	середня	5	
15	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5	
16	Біб: за ширину (від шва до шва)	вузький	3	
17	Суха насініна: форма повздовжнього розрізу	еліптична	2	
18	Суха насініна: маса 100 насінин	середня	5	
19	Суха насініна: забарвлення насіннєвої шкірки (відразу після збирання)	бежеве	1	
20	Суха насініна: чорна пігментація рубчика	наявна	2	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння, т/га – 4,5. Урожайність зеленої маси, т/га – 15. Вміст білка в зеленій масі, % – 22. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7; до вилягання, бал (1–9) – 6; до осипання, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб: бактеріоз (*Bacterium phaseoli* E.F.Sm.), бал (1–9) – 6; фузаріоз (*Fusarium oxysporum* Sch.), бал (1–9) – 6; аскохітоз (*Ascochyta viciae* Libert.), бал (1–9) – 6; смугаста плямистість (*Bacterium lathyri* (Mann. et Taub.) Burgw.), бал (1–9) – 6. Стійкість проти шкідників: бобова зернівка (*Bruchus rufimanus* Boh.), бал (1–9) – 6; бобова (акацієва) вогнівка (*Etiella zinckenella* Tr.), бал (1–9) – 6; бобовий стеблойд (*Lixus algirus* L.), бал (1–9) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛПІ.