

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045038 Назва сорту: Еліна Заявник (код): 2061 Власник сорту (код): 2061

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.07.2020 Патент № 200453

Дата пріоритету: 21.11.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.03.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200527

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,6	3,33	3,02
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,08	1,04	1,14
+ , - до усередненої урожайності, %	-4,6	45,6	60,5
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	104	106	111
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	150,6	205,1	192,4
Висота рослини, см	58,8	79,8	94
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,9	9,9	12,5
Дружність досягання, бал	9	8	8
Кількість бобів на рослині, шт	8	8	8
Кількість зерен у бобі, шт	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсипання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	9	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	36,2	40,5	35,5
Стійкість проти септоріозу, бал	23,8	21,9	23,5
Стійкість проти фузаріозу, бал	6	6	6
Вміст білка, %	зерн	зерн	зерн
Вміст олії, %	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.