

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 16045003 Назва сорту: СБ 142 **Заявник (код):** 2252 2253 **Власник сорту (код):** 2252 2253
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.10.2020
Свідоцтво про державну реєстрацію № 200792
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насінневої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,67	2,29	2,10
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,44	3,02	2,63
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,23	0,73	0,53
+, - усередненої урожайності, %	-13,6	31,7	25,2
Довірчий інтервал, т/га	0,5	0,5	0,5
Тривалість періоду вегетації, діб	107	115	123
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	129,1	171,8	151,6
Висота рослини, см	64,9	72,2	87,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,8	13,0	15,3
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	39,6	42,5	39,2
Вміст олії, %	23,9	20,4	21,6
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.