

Вид: Капуста кольрабі *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *gongyloides* L.

Заявка № 19098002 Назва сорту: Вікора **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.08.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200673

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення сім'ядолей	відсутнє	1	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірне	5	
3	Черешок: перехрещування	відсутнє	1	
4	Черешок: за довжиною	середній	5	
5	Черешок: за товщиною	середній	5	
6	Черешок: за положенням у просторі	похилий	3	
7	Листкова пластинка: за положенням у просторі	напівпряма	3	
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
10	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	4	
11	Листкова пластинка: розділення на частки стосовно центральної жилки (в нижній частині листка)	мало	3	
12	Листкова пластинка: кількість часток (у верхній частині листка)	мало	3	
13	Листкова пластинка: глибина розчленування (у верхній частині листка)	мілка	3	
14	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	плеската	2	
15	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
16	Листкова пластинка: восковість	помірна	5	
17	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	сіруватий	2	
18	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5	
19	Стеблоплід: кількість внутрішніх листків	середня кількість	5	
20	Стеблоплід: колір шкірки	біло-зелений	1	
21	Стеблоплід: форма у поздовжньому розрізі	поперечно-еліптична	2	
22	Стеблоплід: форма верхівки	рівна	5	
23	Рослина: початок збиральної стиглості	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 11. Період від повних сходів до початку досягання, діб – 70. Лежкість, балів (1–9) – 8. Вміст вітаміну С, мг % – 70; загального цукру, % – 3; сухої речовини, % – 8,5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7; бактеріоз судинний – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.