

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 16012018 Назва сорту: МІП Ассоль **Заявник (код):** 1589 **Власник сорту (код):** 1589

Дата пріоритету: 29.04.2016

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.11.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180938

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | слабка | 3 | |
| 2 | Рослина: форма куща (габітус) | прямий | 1 | |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 4 | Кількість рослин із згинутим прапорцевим листком | мала | 3 | |
| 5 | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | ранній | 3 | |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | сильний | 7 | |
| 7 | Колос: восковий наліт | сильний | 7 | |
| 8 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | сильний | 7 | |
| 9 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | низька | 3 | |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом) | слабко виповнена | 3 | |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку) | циліндрична | 2 | |
| 12 | Колос: за щільністю | середній | 5 | |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців) | середній | 5 | |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | наявні зубці | 2 | |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною | середні | 5 | |
| 16 | Колос: забарвлення | біле або солом'яно-жовте | 1 | |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса) | вузьке | 3 | |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою | піднесене | 4 | |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною | дуже короткий | 1 | |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою | ледь зігнутий | 3 | |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні | слабке | 3 | |
| 23 | Нижня квітова луска. Зубець: за формою | середньо зігнутий | 3 | |
| 24 | Зернівка: забарвлення | червоне | 2 | |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | помірне | 5 | |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 | |
| 27 | Зернівка: за довжиною | середня | 5 | |
| 28 | Зернівка: за шириною | середня | 5 | |
| 29 | Зернівка: відношення довжина/ ширина | велике | 7 | |
| 30 | Зернівка: за крупністю | крупна | 7 | |
| 31 | Язичок: виявлення | короткий | 3 | |
| 32 | Нижня квітова луска: кіль | відсутній | 1 | |
| 33 | Вушка: за формою | гострі | 2 | |
| 34 | Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні | слабке | 3 | |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса) | овально-ланцетна | 3 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|------|------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 51,8 | 63,8 | 56,6 |
| Довірчий інтервал, ц/га (±) | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Урожайність, ц/га | 40,6 | 74 | 56 |
| +/- до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га | -11,2 | 10,2 | -0,6 |
| +/- до усередненого значення за п'ять попередніх років, % | -22 | 16 | -1 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 254 | 271 | 270 |
| Висота рослин, см | 82,0 | 90,7 | 95,5 |
| Маса 1000 зерен, г | 39,0 | 46,5 | 46,6 |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | 9 | 9 | 8 |
| Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал | висока | | |
| Стійкість до вилягання, бал | 8 | 8 | 8 |
| Стійкість до обсіпання, бал | 9 | 9 | 8 |
| Стійкість до посухи, бал | 7 | 9 | 8 |
| Стійкість проти борошністої роси, бал | 9 | 9 | 8 |
| Стійкість проти бурої іржі, бал | 9 | 9 | 8 |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал | 8 | 9 | 8 |
| Якість: вміст білка, % | 13,7 | 13,2 | 12,2 |
| Вміст клейковини, % | 27,9 | 26,8 | 24,2 |
| Сила борошна (W).о.а. | 210 | 234 | 225 |
| Об'єм хліба, мл | 950 | 980 | 900 |
| За хлібопекарськими якостями | ф | ф | ф |
| Блок: середньорослі | | | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.