

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 17088010 Назва сорту: Ліллі Заявник (код): 1508 Власник сорту (код): 1508

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.07.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200644

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	широкоциліндрична	4	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	велика	7	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	листковий	3	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	світле	3	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	вузькі	3	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочек: хвильистість краю	помірна	5	
24	Листочек: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочек: глянсуватись верхнього боку	помірно глянсуватий	5	
26	Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час достигання	середній	5	
37	Бульба: форма	видовженоovalна	4	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення мякоті	помірно жовте	4	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		21,8	18,1
Урожайність, т/га		19,02	18,82
+,- до усередненої урожайності, т/га	-2,78	0,72	
+,- до усередненої урожайності, %	-12,7	4	
Довірчий інтервал, т/га	2,85	1,36	
Тривалість періоду вегетації, діб	109	96	
Середня маса товарної бульби, г	81,6	81	
Вміст крохмалю, %	13	11,7	
Збір крохмалю, т/га	24,6	26,8	
Вміст сухої речовини, %	20,1	19,3	
Дегустаційна оцінка, бал	6	5	
Придатність до механізованого збирання, бал	8	9	
Лежкість, бал	8	8	
Товарність бульб, %	72,4	81,1	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	8	8	
Стійкість проти фітофторозу, бал	7	7	
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 – нестійкий, 9 – стійкий, бал	9	9	
Блок (Група стигlostі)	8	8	
Напрям використання	СТЛ	СТЛ	
Якість	СК	НК	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.