

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 17088014 Назва сорту: Опілля **Заявник (код):** 1710 **Власник сорту (код):** 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 18.08.2020 **Патент №** 200033

Дата пріоритету: 23.11.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.07.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200647

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	велика	7	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Світловий паросток: кількість корневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1	
13	Рослина: габітус	прямий	3	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	відкритий	5	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	світле	3	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глясுவатість верхнього боку	помірно глясуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	обрідне	3	
30	Суцвіття: розмір	великий	7	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час досягання	ранній	3	
37	Бульба: форма	куляста	1	
38	Бульба: вічка за глибиною	глибокі	7	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		16,6	16,66
Урожайність, т/га		20,71	16,78
+, - до усередненої урожайності, т/га		4,11	0,12
+, - до усередненої урожайності, %		24,8	0,7
Довірчий інтервал, т/га		7,05	3,73
Тривалість періоду вегетації, діб		93	86
Середня маса товарної бульби, г		91,7	85,3
Вміст крохмалю, %		15,8	14,6
Збір крохмалю, т/га		31,3	27,6
Вміст сухої речовини, %		23,6	22,6
Дегустаційна оцінка, бал		7	6
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Лежкість, бал		7	7
Товарність бульб, %		75,9	82,3
Стійкість проти макроспоріозу, бал		8	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		6	6
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 – нестійкий, 9 – стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		7	7
Напрямок використання		стл	стл
Якість		ск	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.