

**Вид:** Костриця несправжньоовеча *Festuca pseudovina* Hack. ex Wiesb.

**Заявка № 19660001 Назва сорту:** Інгела **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.09.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200730**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Піхва листка: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: за природною висотою	середня	5	
4	Рослина: габітус	проміжний	5	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Лише для сортів костриці червоної: Листок: за шириною	ознака не визначається	0	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
8	Листок: сизий наліт	відсутній	1	
9	Рослина: формування	відсутнє або слабке	1	
10	Рослина: час появи суцвіття	ранній	3	
11	Рослина: за природною висотою під час появи суцвіття (прапорцевий листок не враховують)	середня	5	
12	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5	
13	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною	ознака не визначається	0	
14	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина/ширина	ознака не визначається	0	
15	Рослина: найдовше стебло за довжиною (суцвіття включно)	середнє	5	
16	Рослина: верхнє міжвузля за довжиною	середнє	5	
17	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
18	Суцвіття: антоціанове забарвлення волоті	відсутнє або слабке	1	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 1. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості насіння, діб – 92. Поява сходів після сівби, діб – 15. Група стиглості: 3 – рання. Маса 1000 насінин, г – 1. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Загальна декоративність, бал (1–9): навесні – 8; влітку – 8; восени – 8. Проективне покриття, %: до скошування – 92; після скошування – 85. Щільність паростків, % – 87. Стійкість до витоптування, бал (1–9) – 8. Темпи відростання: 5 – рівномірне. Утворення потужної дернини, бал (1–9) – 7. Тонколистість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Puccinia* sp.) – 8; сажка (*Ustilago festucarum* Liro.) – 7; борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): шведська муха (*Oscinella frit* L.) – 7; гессенська муха (*Mayetiola destructor* S.) – 7; попелиця (*Aphis*) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.