

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai**Заявка № 18146010 Назва сорту:** Амалтея **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.08.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200693****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	триплоїд	3	
2	Сім'ядолі: форма	широкоеліптична	3	
3	Сім'ядолі: розмір	малий	3	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвуля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	2	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	сильний	7	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5	
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10-15 листках)	слабка	3	
15	Листкова пластинка: мармуровість	помірна	2	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опущення	помірне	5	
19	Плід: маса	середня	5	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	1	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	сильна	7	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	малий	3	
24	Плід: загиблення біля основи	мілке	3	
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3	
26	Плід: загиблення верхівки	відсутнє або дуже мілке	1	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	відсутні або дуже слабкі	1	
30	Плід: вираження смуг	відсутнє або дуже слабке	1	
31	Плід: характер смуг	ознака не визначається	0	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	ознака не визначається	0	
33	Плід: смуги за ширину	ознака не визначається	0	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	відсутня або дуже слабка	1	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	товстий	7	
36	Плід: основне забарвлення мякоті	червоне	6	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення мякоті	помірна	5	
38	Плід: мякоть за твердістю	помірна	5	
39	Лиш диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	ознака не визначалась	0	
40	Насініна: розмір	малий	3	
41	Лиш диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насініна: основне забарвлення оболонки	ознака не визначається	0	
42	Лиш диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насініна: вторинне забарвлення оболонки	ознака не визначається	0	
43	Лиш диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насініна: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	ознака не визначається	0	
44	Лиш диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насініна: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	ознака не визначається	0	
45	Лиш диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насініна: плями біля рубця	ознака не визначається	0	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	ранній	3	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	відсутня	1	
50	Листкова пластинка: розмір	великий	5	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Плід: смуги за характером	ознака не визначається	0	
54	Плід: основне забарвлення смуг	ознака не визначається	0	
55	Плід: восковий наліт	помірний	5	
56	Лиш триплоїдні сорти: Насіннєва оболонка: за розміром	мала	3	
57	Лиш диплоїдні і тетраплоїдні сорти: Насініна: за довжиною	ознака не визначається	0	
58	Лиш диплоїдні і тетраплоїдні сорти: Насініна: відношення довжина/ширина	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 55. Вміст сухої речовини в плоді, % – 11; загального цукру, % – 12. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 97.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.