

Вид: Фенхель звичайний *Foeniculum vulgare* Miller

Заявка № 19066001 Назва сорту: Прелюдіо **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.08.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200672

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|-----------------------|-----|----------|
| 1 | Молода рослина: довжина сім'ядолі | середня | 5 | |
| 2 | Молода рослина: довжина черешка першого листка | середній | 5 | |
| 3 | Лише для сортів з головками: Рослина: за висотою (за досягнення) | середня | 5 | |
| 4 | Листки: положення | напівпрямe | 3 | |
| 5 | Листки: за щільністю розташування | помірно щільно | 5 | |
| 6 | Листки: інтенсивність зеленого забарвлення | поміrnе | 5 | |
| 7 | Головне стебло: висота за цвітіння | середнє | 5 | |
| 8 | Листок: за довжиною | середній | 5 | |
| 9 | Листок: вигин верхівки | слабко виражений | 2 | |
| 10 | Рослина: формування головки | наявне | 9 | |
| 11 | Лише для сортів з головкою. Головка: за висотою | середня | 5 | |
| 12 | Лише для сортів з головкою. Головка: за шириною | широка | 7 | |
| 13 | Лише для сортів з головкою. Головка: відношення висота/ширина | середнє | 5 | |
| 14 | Лише для сортів з головкою. Головка: за товщиною | товста | 7 | |
| 15 | Лише для сортів з головкою. Головка: форма у поперечному розрізі | кругла | 1 | |
| 16 | Лише для сортів з головкою. Головка: зовнішній колір | блуватий | 1 | |
| 17 | Лише для сортів з головкою. Головка: за інтенсивністю зеленого кольору | світла | 3 | |
| 18 | Лише для сортів з головкою. Піхва: ребристість | слабка | 3 | |
| 19 | Лише для сортів з головкою. Піхва: перекриття листкових піхв | сильне | 7 | |
| 20 | Лише для сортів з головкою. Час досягнення головок | ранній | 3 | |
| 21 | Лише для сортів з головкою: тенденція до стрілкування | дуже сильна | 9 | |
| 22 | Чоловіча стерильність | наявна | 9 | |
| 23 | Лише для сортів, що не утворюють головку. Головний зонтик: діаметр | ознака не визначалась | 0 | |
| 24 | Лише для сортів, що не утворюють головку. Час утворення головного зонтика | ознака не визначалась | 0 | |
| 25 | Лише для сортів, що не утворюють головку. Час початку цвітіння | ознака не визначалась | 0 | |
| 26 | Лише для сортів, що не утворюють головку. Насіння: маса 1000 шт. | ознака не визначалась | 0 | |
| 27 | Лише для сортів, що не утворюють головку. Час збирання стиглого насіння | ознака не визначалась | 0 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність коренеплодів, т/га – 1,5. Вміст сухої речовини, % – 11. Середня маса коренеплоду, г – 250. Лежкість коренеплодів, бал (1–9) – 8. Тривалість періоду від появи сходів до технічної стигlosti плодів, діб – 70.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, Згр.