

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

Заявка № 18118003 Назва сорту: Романо **Заявник (код):** 2241 **Власник сорту (код):** 2241

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200773

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
3	Сім'ядолі: розмір	великий	7	
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5	
5	Листок: положення у просторі	горизонтальне	5	
6	Листок: за довжиною	довгий	7	
7	Листкова пластинка: форма	оберненояцеподібна	3	
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	сіруватий	3	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	середня	5	
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9	
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3	
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
17	Коренеплід: діаметр	великий	7	
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	вузький	3	
19	Коренеплід: форма	еліптична	3	
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3	
21	Коренеплід: форма основи	тупа	3	
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1	
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	рожеве	2	
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	багряне	2	
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0	
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3	
27	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	матове біле	2	
28	Час досягання	ранній	3	
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1	
30	Коренеплід: за довжиною	кородкий	3	
31	Коренеплід: форма плеча	тупа	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 50. Тривалість періоду до досягання, дів – 25. Середня маса плоду, г – 20. Вміст сухої речовини, % – 5; вітаміну С, мг/% – 13.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.