

**Вид:** Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

**Заявка № 19120020 Назва сорту:** Вебер **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата пріоритету:** 17.09.2019

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.10.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200787**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	чорне	3	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	пряме	1	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	часточкова	2	
7	Рослина: діаметр	малий	3	
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1	
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0	
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	пряме	1	
16	Листок: форма	поперечно-широкоеліптична	5	
17	Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	сильна	7	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
26	Листок: розмір пухирів	малий	3	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутня	1	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначається	0	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0	
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне жилкування	помірне	5	
34	Час збиральної стиглості	ранній	3	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	середній	5	
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	дуже слабка	1	
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	ознака не визначалась	0	
42	Стійкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалась	0	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 25.3. Тривалість періоду до досягання, діб – 32.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.