

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 19120015 Назва сорту: Тамбей Заявник (код): 1730 Власник сорту (код): 1730

Дата пріоритету: 17.09.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200784

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	розчленована	3	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1	
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0	
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	тонкий	3	
15	Листок: положення за збиральною стиглою (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3	
16	Листок: форма	ознака не визначалась	0	
17	Листок: форма верхівки	ознака не визначалась	0	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірна	5	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
26	Листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	глибока	7	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	сильна	7	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	зубчаста	2	
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2	
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабе	1	
34	Час збиральної стиглою	середній	5	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	ранній	3	
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1	
41	Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	ознака не визначалась	0	
42	Стійкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалась	0	

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 24,5. Тривалість періоду до досягання, діб – 32. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 8; борошниста роса – 7; біла гниль – 8; септоріоз – 7.

## Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.