

**Вид:** Порічки *Ribes rubrum* L.**Заявка № 19300001 Назва сорту:** РОВАДА**Заявник (код):** 2516**Власник сорту (код):** 2516**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 19.10.2020**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200762****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	середня	5	до сильної
2	Рослина: щільність розміщення пагонів	середня	5	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	2	до розлогого
4	Рослина: кількість головних пагонів	середня	5	
5	Брунька: положення відносно пагона	притиснуте або злегка відхилене	1	
6	Брунька: за довжиною	коротка	3	
7	Брунька: форма верхівки	широкозагострена	2	
8	Брунька: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Брунька: наліт	сильний	5	
10	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	слабке	2	
11	Молодий листок: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
12	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
13	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
14	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
15	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	5	
16	Черешок: за товщиною	середній	3	
17	Суцвіття: кількість квіток	велика	7	
18	Суцвіття: антоціанове забарвлення осі	помірне	5	
19	Квітка: розмір	середній	5	
20	Квітка: вигин чашечки	середній	3	
21	Квітка: антоціанове забарвлення чашечки	помірне	5	
22	Плодове гроно: за довжиною не включаючи плодоніжку	довге	7	до дуже довгого
23	Плодове гроно: плодоніжка за довжиною	довга	7	
24	Плодове гроно: щільність розміщення ягід	середня	5	
25	Ягода: розмір	середній	5	до великого
26	Ягода: форма	округла	2	
27	Ягода: забарвлення	червоне	4	
28	Час розпускання бруньок	середній	5	
29	Час початку цвітіння	середній	5	до пізнього
30	Час початку достигання плодів	пізній	7	

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 25,0. Середній урожай з куща, кг – 6,0. Середня маса ягоди, г – 0,7. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 64,1; загального цукру, % – 8,9; пектинових речовин, % – 0,78; сухих розчинних речовин, % – 11,9. Загальна кислотність, % – 1,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 7; септоріоз – 8; борошниста роса – 7; іржа – 9. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): кліщ бруньковий – 8; попелиця – 7. Рівень підмерзання бруньок, % – менше 5. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Група стигlosti – пс. Напрям використання – ун. Схема садіння – 2,5 × 0,7. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.