

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

Заявка № 19304003 Назва сорту: Кардишах таїровський **Заявник (код):** 1904 **Власник сорту (код):** 1904

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.09.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200713

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	дуже ранній	1	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	широковідкрита	4	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	світло-мідно-червоне	4	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	напіввертикальне	3	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	дуже довгі	9	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	середній	5	
18	Розвинений листок: форма пластинки	серцеподібна	1	
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	сильна	7	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	глибокі	7	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листових вирізів	слабко перекриваються	3	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	наполовину перекриваються	7	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	мале	3	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	відсутня або дуже низька	1	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	нещільна	3	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	коротша	2	
31	Час початку досягання ягід	дуже ранній	1	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	середній	5	
33	Гроно: за щільністю	середнє	5	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	середній	5	
36	Ягода: форма	куляста	2	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	рожеве	5	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	важке	1	
39	Ягода: шкірка за товщиною	середня	2	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	помірно тверда	2	
42	Ягода: особливий аромат	мускатний	2	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	жовтувато-коричневе	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 9,0. Середній урожай з куща, кг – 4,1. Середня маса 100 ягід, г – 390,0. Середня маса грона, г – 320,0. Горошіння ягід, % – 1,0. Розтріскування ягід, % – 1,0. Лежкість при зберіганні, діб – 5. Вихід соку, % – 73,0. Вміст диглікозидів, мг/дм³ – не виявлено. Вміст кислот у ягодах, г/л – 3,7. Цукристість соку ягід, % – 16,2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 6; мілдью – 5,5; оїдіум – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 8; філоксера – 8. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, діб – 110. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 2. Рівень підмерзання лози, бал (1–9) – 1. Група стиглості – др. Напрямок використання – стл. Схема садіння – 3 × 1,5. Транспортувальність, бал (1–9) – 7. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7,9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.