

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

Заявка № 19304005 Назва сорту: Одеський жемчуг **Заявник (код):** 1904 **Власник сорту (код):** 1904

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.09.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200715

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	середній	5	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	напіввідкрита	3	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	щільна	7	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	винно-червоне	6	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	середня	5	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	напіввертикальне	3	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	червоне	3	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	середні	5	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	середній	5	
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3	
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	помірна	5	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	глибокі	7	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листових вирізів	відкрите	1	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	напіввідкрите	3	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	середнє	5	
26	Розвинений листок: форма зубців	один бік увігнутий, другий – випуклий	4	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	відсутня або дуже низька	1	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	середня	5	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	довша	4	
31	Час початку достигання ягід	ранній	3	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	середній	5	
33	Гроно: за щільністю	щільне	7	
34	Гроно: ніжка первинного гроно за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	середній	5	
36	Ягода: форма	куляста	2	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	блакитно-чорне	9	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	тонка	1	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	сильне	7	
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або слабко тверда	1	
42	Ягода: особливий аромат	мускатний	2	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	жовтувато-коричневе	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 13,5. Середній урожай з куща, кг – 6,0. Середня маса 100 ягід, г – 260,0. Середня маса гроно, г – 290,0. Горощиння ягід, % – 1,7. Розтріскування ягід, % – 0,5. Лежкість при зберіганні, днів – 3. Вихід соку, % – 84,0. Вміст диглікозидів, мг/дм³ – не визначався. Вміст кислот у ягодах, г/л – 6,0. Цукристість соку ягід, % – 20,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 6; мілдью – 7; оїдіум – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 8; філоксера – 8. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, днів – 123. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7,2. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 2. Рівень підмерзання лози, бал (1–9) – 1. Група стиглості – рсдн. Напрямок використання – тхн. Схема садіння – 3 × 1,5. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7,92.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.