

**Вид:** Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

**Заявка № 19304001 Назва сорту:** Персей **Заявник (код):** 1904 **Власник сорту (код):** 1904

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 11.09.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200711**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	ранній	3	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	повністю відкрита	5	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	дуже щільна	9	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	помірне	5	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	зелене	2	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	середня	5	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	напіввертикальне	3	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	червоне	3	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	червоне	3	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	довгі	7	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	великий	7	
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3	
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	слабка	3	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	глибокі	7	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листових вирізів	закрите	2	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	закрите	5	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	довгі	7	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	середнє	5	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	відсутня або дуже низька	1	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	щільна	7	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	щільна	7	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	однакова	3	
31	Час початку достигання ягід	середній	5	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	середній	5	
33	Гроно: за щільністю	нещільне	3	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	великий	7	
36	Ягода: форма	циліндрична	5	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	темно-червоно-фіолетове	8	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	тонка	1	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	помірно тверда	2	
42	Ягода: особливий аромат	відсутній	1	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	жовтувато-коричнє	1	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 12,0. Середній урожай з куща, кг – 5,4. Середня маса 100 ягід, г – 450,0. Середня маса грона, г – 520,0. Горішність ягід, % – 0,5. Розтріскування ягід, % – 3,0. Лежкість при зберіганні, діб – 3. Вихід соку, % – 86,0. Вміст диглікозидів, мг/дм<sup>3</sup> – не виявлено. Вміст кислот у ягодах, г/л – 4,5. Цукристість соку ягід, % – 16,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 7; мілдью – 7; оїдіум – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 8; філоксера – 8. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, діб – 125. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 6,5. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 2. Рівень підмерзання лози, бал (1–9) – 1. Група стиглості – сс. Напрямок використання – стл. Схема садіння – 3 × 1,5. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8,3.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**