

Ноябрська Молдавії. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН. Отриманий від схрещування у 1962 році сортів Триум Вієни x Криер.

Сорт зимового строку досягання, зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання та хвороб висока.

Придатний для загальноприйнятої технології вирощування.

Дерево середньоросле, крона середньої густоти у молодих дерев – високопірамідальна, пізніше – широкопірамідальна. Плоди великі, правильної форми, злегка ребристі, середня маса плоду – 180-250 г, максимальна – 350 г. Основне забарвлення в період знімальної зрілості – зелене, покривне – рожеве, у вигляді легкого загару. М'якуш кремового забарвлення, соковитий, маслянистий, ніжний. Краща підщепа для сорту – айва "А". Сорт потребує запилювання, кращі запилювачі Васса, Ізмурудна, Виставочна, Джанкойська пізня. Вміст цукрів – 12,6%, кислот – 0,20%, вітаміну С – 7,8 мг %, плоди мають відмінний десертний смак. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Транспортабельність добра.

Рекомендована зона вирощування – Крим.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Зареєстрований у 2000 році.

Черемшина. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1960 році сортів Бере Гарді x Жозефіна Мехельнська.

Сорт зимового строку досягання.

Дерево швидкокоросле, утворює високопірамідальну, середньозагущену крону, дещо розлогу. Починає плодоносити на 5-6-й рік. Плоди дещо неодномірні, вище середньої величини або крупні (160-170 г, крупні 240-250 г). Забарвлення в період знімальної стиглості – сірувато-зелене, під час досягання – інтенсивно жовте або жовтувато-оранжеве. М'якуш інтенсивно кремовий, майже жовтий, дуже соковитий, ніжний, маслянистий, дуже приємного кислувато-солодкого смаку з легким ароматом троянди. Вміст цукрів – 9,3%, кислот – 0,40%, пектинів – 2,2%, вітаміну С – 1,5 мг %. Дегустаційна оцінка – 9 балів.

Відрізняється скороплідністю, високою урожайністю з перших років плодоношення, відмінним смаком плодів, зимостійкістю і стійкістю до грибкових хвороб.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Зареєстрований у 2000 році.

Наджда степу. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.

Сорт осіннього строку досягання. Зимостійкість та холодостійкість сорту оцінюється у 9 балів, стійкість до осипання та хвороб – висока.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Напрямок використання – свіжі плоди. Зареєстрований у 2000 році.