

Шаміль. Заявник Меженський В. М, Меженська Л. О.
Сорт пізньостиглого строку досягання.
Рекомендований для зони Степу, Лісостепу, Полісся.
Напрямок використання – універсальний.
Зареєстрований у 2001 році.

ЖИМОЛОСТЬ

Богдана. Заявник Краснокутська дослідна станція Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом міжвидової гібридизації сіянців жимолості Турчанінова з відбірним сіянцем жимолості камчатської.

Сорт середньостиглого строку досягання.

Відрізняється дуже раннім дозріванням ягід, скороплідністю, дуже високою врожайністю. Рослина середньої сили росту, формує негустий, середньорозлогий, округлої форми кущ. Плоди середньою масою – 1,1 г, великі – 1,5 г, сині, з густим голубуватим восковим нальотом, подовженокувшиноподібні. Шкірка тоненька але, міцна, з сухим відривом. М'якуш ніжний, десертного кисло-солодкого смаку. Вміст цукрів – 8,85%, кислот – 2,03%, вітаміну С – 69 мг %. Дегустаційна оцінка – 7 балів.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп.

Зареєстрований у 2000 році.

Дончанка. Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібрана у 1991 році серед сіянців від вільного запилення.

Маточна рослина – компактний, середньозагущений кущ, висотою – 140 см, діаметром – 120 см. Плоди, внаслідок сильно вкорочених міжвузлів, по 10-12 штук скупчено розмішені поблизу основи цьогорічних пагонів. Прикріплення плодів середнє, що призводить до їх незначного осипання (10-15%) і легкого відділення від плодоніжки при збиранні. Плоди темно-сині з восковим нальотом, еліптично видовжені, часто з загостреною основою та верхівкою, з досить щільним м'якушем, тонкою шкірочкою і темно-вишневим кольором соку. Смак кисло-солодкуватий, без гіркоти, з приємним ароматом. Плоди завдовжки 17-20 мм, завширшки 8-10 мм, плодоніжка довжиною 1-2 мм. Плоди містять 18-20 дуже дрібних насінин, що майже не відчувається при споживанні свіжих плодів та продуктів їх переробки. Маса 100 шт. плодів – 70 г. Урожай із одного куща у 8-річному віці – 1,1 кг. У плодах міститься: сухих речовин – 17,3%, золи – 1,3%, цукрів – 6,1%, кислот – 3,0%, каротину – 5,8 мг %, вітаміну С – 40,0 мг %.

Сорт ранньостиглого строку досягання.

Напрямок використання – універсальний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп.

Зареєстрований у 2001 році.