

**Вернісаж.** Заявник Інститут садівництва УААН. Сіянець 85в-19-42 отриманий шляхом схрещування у 1985 році сортів Клусоновська х Тритон, від яких в його геномі присутня геноплазма європейського і сибірського підвидів чорної смородини, далекосхідних видів дикуша і смородини уссурійської. Це забезпечує олігогенну стійкість до борошнистої роси, антракнозу, стовпчастої іржі, брунькового кліща.

Сорт середньостиглого строку досягання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, самоплідністю, підвищеною засухостійкістю.

Кущ високий, напіврозлогий. Пагони довгі, середньої товщини. Грона середні, густі. Ягоди одномірні, середньою масою – 1,6 г, великі – 2 г, округло-овальні, чорні, блискучі. Шкірка міцна, з сухим відривом. М'якуш зеленувато-коричневий, помірно-ароматний, кисло-солодка містить сухих речовин – 15,02-16,42%, цукрів – 8,64-9,24%, кислот – 2,72-3,44%, пектинів – 1,42- 1,98%, фенольних сполук – 346,12-458,36 мг, вітаміну С – 169,24-186,46 мг%. Досягання майже одночасне. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, а особливо для різних видів технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся, Степ.

Зареєстрований у 2003 році.

**Вербна.** Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН.

Зимостійкість, стійкість для посухи, осипання та хвороб – висока.

Середня маса плоду – 1,5 г. Вміст у плодах: цукрів – 5,52%, вітаміну С – 325,0 мг%. Стійкість до борошнистої роси та септоріозу висока.

Зимостійкість, стійкість до посухи, осипання та хвороб – висока.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Сорт середньопізнього строку досягання.

Напрямок використання – універсальний.

Зареєстрований у 2004 році.

**Надбужанська.** Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий від схрещування у 1986 році сортів Лесковіца х Делікатес.

Сорт пізнього строку досягання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, крупноплідністю, високим вмістом біоактивних речовин, комплексною стійкістю до борошнистої роси, антракнозу, септоріозу, добре адаптований до умов підвищеної вологості.

Кущ середньорослий, слаборозлогий. Пагони середні, прямі. Грона короткі або середні, рихлі, густо розміщені на пагоні. Ягоди досить одномірні, середньою масою 1,1 г, великі – 2,4 г, округлі, чорні, блискучі. Шкірка середня, еластична, міцна, з сухим відривом. М'якуш густий, коричневий, з слабким ароматом смородини, приємного освіжаючого кисло-солодкого смаку; містить сухих речовин --