

Килимова. Сунично-полуничний гібрид. Заявник приватна сільськогосподарська науково-виробнича фірма “Новий сад”. Використовується в садах як біологічна мульча. Ягоди дрібні, неїстівні.

Зимостійкість, стійкість до посухи та хвороб – висока.

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2004 році.

КІВІ

Монті. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.

Зимостійкість вище середньої, стійкість до посухи та хвороб висока.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Зареєстрований у 2000 році.

Напрямок використання – запилювач.

Томурі. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.

Зимостійкість вище середньої, стійкість до посухи та хвороб висока.

Рекомендована зона вирощування – Степ.

Зареєстрований у 2000 році.

Напрямок використання – запилювач.

ЛИМОН

Мейер. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.

Зимостійкість висока, стійкість до посухи та хвороб середня.

Сорт ремонтантний.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2003 році.

Напрямок використання – свіжі плоди.

Лісбон. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.

Зимостійкість висока, стійкість до посухи та хвороб середня.

Сорт пізньостиглого строку досягання.

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся.
Зареєстрований у 2004 році.
Напрямок використання – свіжі плоди.

МИГДАЛЬ

Мілас. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.
Зимостійкість, стійкість до посухи, та хвороб висока.
Сорт ранньостиглого строку досягання.
Рекомендована зона вирощування – Степ.
Зареєстрований у 2000 році.
Напрямок використання – універсальний.

ОПИСИ СОРТІВ ВИНОГРАДУ ТА ПІДЩЕПНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ, що занесені до Реєстру сортів , придатних для поширення в Україні

ВИНОГРАД

Данко. Заявник Всесоюзний НДІ виноробства і виноградарства „Магарач” (Лімбергер x Ркацителі). Прийнятий у випробування ДК СРСР у 1982 р.

Винний, з чорною ягодою. Стійкий до філоксери і грибкових хвороб. В умовах Криму має високо стабільні врожаї - більше 100 ц/га, відрізняється високим стабільним рівнем цукронакопичення – 22,0-23,0 г/100 см³ і стабільною оптимальною кислотністю – 7-8 г/дм³. Сорт має високу технологічність. Із його врожаю можна виробляти як сухі, так і міцні червоні вина Кагор. Високий запас красильних речовин і їх стабільність дозволяють використовувати врожай сорту у виробництві витриманих марочних вин.

Сорт зареєстрований у 2003 році у 1-6 зонах Криму.

Цимлянський чорний. Місцевий донський, винний, з чорною ягодою сорт. Прийнятий у випробування ДК УРСР у 1958 році. Цінний старовинний технічний сорт винограду, що використовується в Криму для виготовлення унікальних марочних столових, міцних та ігристих вин, які користуються підвищеним попитом у споживача. Сила росту кущів – помірна. Визрівання пагонів добре. Сорт – зимостійкий.

Кущі середньорослі. Середня врожайність – 60 ц/га.

Сорт зареєстрований у 2, 4-6 зонах Криму у 2002 році.