

Смак добрий. Грона циліндричні, середні за величиною та щільністю. Технічна стиглість ягід настає в кінці вересня – початку жовтня. Врожайність сорту середня. Цукристість соку залежить від погодних умов і коливається від 19 до 23 г/см³ і вище, при кислотності 5,5 – 7 г/дм³. Сорт високо посухо- і солестійкий. Середностійкий до грибкових хвороб.

Використовується виноград для одержання високоякісного десертного вина „Сонячна долина”.

Зареєстрований у 5 і 6 виноградарських зонах у 2002 році.

Серексія чорна. Місцевий молдавський сорт, який культивується у Придністров’ї з давніх часів. В Україні вирощується широко.

Відноситься до технічних сортів пізнього строку дозрівання.

Веgetаційний період від розпускання бруньок до дозрівання ягід приблизно 150 днів при необхідній сумі температур. Сорт високоврожайний, особливо у кореневласних насадженнях на піщаних ґрунтах. Також добре росте і плодоносить на підщепах Р x Р 101-14 і 3309. Із сусла цього сорту виготовляють ординарні червоні столові вина. В останні роки в Україні із сорту виготовляють за особливою технологією дуже смачні десертні вина і одержують коньячні спирти. Дуже добре накопичує цукор. Квітки двостатеві, грона – від середніх до дуже великих розмірів, ягоди середньої величини, темносині. Шкурка в ягоди середньої товщини. М’якуш ягоди дуже приємний, але простого смаку. Сорт зимостійкий і стійкий проти грибкових хвороб. Більше всього використовується для купажування з другими червоними винами.

Сорт зимостійкий і стійкий проти грибкових хвороб.

Зареєстрований у 9-ій виноградарській зоні у 2002 р.

Оригінал. Виведений Інститутом виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова шляхом генеративної гібридизації, вихідні форми (Дамаська роза x СВ 20365), сорт столового направлення, продуктивний, стійкий до найбільш небезпечних щирокорозповсюджених грибкових хвороб – мілдью, оїдіуму.

Має декоративний вигляд грон і ягід, високі смакові і товарні якості, транспортабельний. Зимостійкий, посухостійкий.

Коренева система толерантна до філоксери, добре адаптується до умов вирощування. Недоліки сорту – не рівномірне дозрівання грон, багато пасинків. Дозрівання лози добре, куці – сильнорослі.

Рекомендований для вирощування у АР Крим, більшій частині степової зони України, Молдові, Російській Федерації.

Зареєстрований у 8-ій виноградарській зоні України у 2002 році.

ПІДЩЕПНІ СОРТИ ВИНОГРАДУ

БЕРЛАНДІЕРІ x РІПАРІА КОБЕР 5ББ – підщепа інтродукована із Австрії.

Відрізняється більш високим розвитком лози (в середньому 20 тис. чубуків з гектара), але гіршим укоріненням чубуків і більш низьким виходом прищеплених саджанців у порівнянні з контрольною підщепою 101-14.

Кущі сильнорослі, досягання лози хороше. Відрізняється високою стійкістю до підвищеного вмісту вапна в ґрунті, тому позитивно оцінюється в районах, де багато карбонатних ґрунтів.

Квітка функціонально – жіноча. Гроно дрібне, рихле. Ягода дуже дрібна, не їстівна, синювато-чорна.

Зареєстрована у всіх виноградарських зонах України у 2004 році.

БЕРЛАНДІЄРІ x РШАРІА ТЕЛЕКІ 5 Ц – інтродукована із УНР. Зимостійка, відрізняється хорошим лозоношенням (вихід стандартних чубуків 56 тис. з га. проти 30 тис. з га. у контрольної підщепи 101 – 14), добрим укоріненням чубуків і виходом прищеплених саджанців. Кущі сильнорослі, лоза визріває задовільно. Невибаглива до ґрунтових умов, але слабо стійка до підвищеного вмісту активного вапна в ґрунті. Квітка – чоловіча.

Зареєстрована у всіх виноградарських зонах України в 2004 році.

БЕРЛАНДІЄРІ x РШАРІА СО4 – інтродукована з ФРН, зимостійка.

Підщепи СО4 відрізняється більш високим лозоношенням (вихід стандартних чубуків 52 тис. з га, проти 30 тис. га у контрольної підщепи 101-14). Чубуки СО4 гірше укорінюються ніж 101 – 14. За виходом прищеплених саджанців істотних переваг перед контрольним сортом немає. Квітки чоловічі, лоза визріває добре. Широко поширена по всіх виноградарських зонах.

Зареєстрована в Україні у 2004 році.

РШАРІА x РУПЕСТРІС 101-14 – інтродукована із Франції, зимостійка. Кущ сильнорослий. За даними державного сортовипробування підщепи 101-14 відрізняється дуже хорошим укоріненням чубуків (виходом кореневласних саджанців – 52,8%), високим виходом прищеплених саджанців в комбінації з сортом Аліготе (45,2%), добрим визріванням лози, високою стійкістю до кореневої форми філоксери. Підщепи 101-14 являється найбільш поширеною підщепою в Одеській області, що займає у виробництві маточників більше 70% площ.

Квітки функціонально-жіночі, гроно маленьке, ягоди дрібненькі, чорні, неїстівні.

Зареєстрована у всіх виноградарських зонах України у 2004 році.

РШАРІА x РУПЕСТРІС 3309 – інтродукована із Франції. Поступається контрольному сорту 101-14 за виходом стандартних чубуків, однак, краще вкорінюється. За виходом підщепних саджанців переваг особливих також немає. Відрізняється середньою силою росту куща, підвищеною можливістю до утворення пасинків.

Відносно стійка до вмісту в ґрунті активного вапна. Визрівання лози добре. Квітки – чоловічі. Зимостійка.

Зареєстрована у всіх виноградарських зонах України у 2004 році.