

Середньорослий, висота рослин 92 – 94 см.

Середньостиглий, вегетаційний період становить 93 – 94 дні. Стійкість до вилягання 8,5 бала, неосипається, стійкість до засухи 7,8 бала.

Слабо уражується борошнистою росою, бурюю іржею, фузаріозом.

Середня урожайність сорту за роки випробування становила 36,4 – 39,4 ц/га, гарантована прибавка склала 5,0 ц/га. Цінна пшениця. Вміст білку становить 13,8%, клейковини 28,0%, сила борошна 336 о. а., об'єм хліба – 1010 мл. Загальна хлібопекарська оцінка сорту 8,0 балів.

Сорт внесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення по зонах Лісостеп, Полісся.

## ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА

### **ХАРКІВСЬКА 41.** Заявник – Інститут рослинництва УААН.

Різновидність леукурум.

Тип розвитку ярий. Кущ прямий. Антоціанове забарвлення сходів відсутнє або слабе. Стебло середньої довжини та міцності, виповнене. Опущення верхнього вузла та восковий наліт на ньому відсутні або дуже незначні. Колос білий, циліндричний, середньої довжини та щільності. Остюки розміщені по всій довжині колосу, білі, довщі за колос. Колоскова луска видовженої форми, плече скошене, вузьке. Зубець короткий, злегка скошений. Зернівка біла, напіввидовжена, середньої величини. Маса 1000 зерен 41,1 г.

Висота рослин 101 см, середньоросла.

Середньостиглий, вегетаційний період 93 дні. Стійкість до вилягання 8,3 бала. Стійкість до засухи 8,1 бала.

Основними хворобами зернових культур уражувався слабо.

Середня урожайність за роки випробування склала 31,6 ц/га.

Гарантована прибавка становила 3,1 ц/га. Вміст білку 15,5%. Загальна оцінка макаронних виробів 7,5 бала.

Внесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення по зоні Лісостепу.

### **ХАРКІВСЬКА 39.** Заявник- Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва.

Різновидність гордейформе.

Тип розвитку ярий. Кущ прямий. Рослини середньорослі, висотою 95-100 см. Колос червоний, циліндричний, середньої довжини та щільності. Остюки розташовані по всій довжині колосу, світлокоричневі, на верхівці- довші за колос. Колоскова луска видовженої форми. Плече округле, вузьке. Зубець короткий, прямий. Зернівка біла, напіввидовжена, середньої крупності. Маса 1000 зерен 39 г.

Середньоранній, вегетаційний період 86 днів. Стійкість до вилягання 4,6 бала. Не осипається. До засухи стійкість оцінена в 4,2 бала.

Хворобами уражувався середньо, на рівні стандартів.

За роки випробування середня врожайність сорту становила 25,9 ц/га, гарантована прибавка склала 1,0 ц/га, зерно скло видне, містить 15,5% білку.

Загальна оцінка макаронних виробів 4,1 бала.

Внесений до Реєстру сортів рослин, рекомендований для вирощування в зоні Степу.

## ТРИТИКАЛЕ ЯРЕ

**АРСЕНАЛ.** Заявник – Приватне підприємство „Сорт”.

Кущ проміжної форми. Стебло середньої товщини, міцне. Листя світлозелене, велике за розміром без опушення та воскового нальоту. Колос білий, веретеноподібний, довгий, щільний. Колоскова луска ланцетна. Зубець гострий, короткий. Плече вузьке, скошене. Кіль гострий, середньо виражений. Остюки білі, короткі, середньорозлогі, зазубрені. Зернівка червона, овальнодовжена, крупна. Маса 1000 зерен 39,8 г.

Вегетаційний період 98 днів.

Рослини висотою 95-100 см.

Стійкість до вилягання 4,9 бала, до осипання 5,0 балів, до засухи 4,4 бала.

Основними хворобами уражувався слабо.

Середня урожайність сорту за роки випробування становила 42,6 ц/га.

Гарантована прибавка становила 2,33 ц/га. Вміст білку в зерні 12,5 %.

Внесений до Реєстру сортів рослин України, рекомендований для зони Полісся.

**ВІКТОРІЯ.** Заявник - Носівська селекційна дослідна станція, НВТ „Агро – Інтер”

Гексаплоїдний. Тип розвитку ярий. Сходи мають середнє антоціанове забарвлення. Кущ прямий. Стебло середньоросле, середньо виповнене, опушення середнє. Колос пониклий, білий, веретеноподібний, довгий, частково не вимолочуються верхівки. Остюки середньої довжини, коротші за колос, розташовані по всій його довжині, слабо розведені, світо – сірі. Зернівка червона, виповнена, пшеничного типу.

Рослини заввишки 97 см. Достигає за 97 днів, відноситься до середньостиглих сортів. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала, стійкість до засухи 8,1 бала.

Сорт слабо уражується борошнистою росою та бурюю іржею.

Середня урожайність сорту за роки випробування склала 38,2 ц/га.