

Хворобами уражувався середньо, на рівні стандартів.

За роки випробування середня врожайність сорту становила 25,9 ц/га, гарантована прибавка склала 1,0 ц/га, зерно скло видне, містить 15,5% білку.

Загальна оцінка макаронних виробів 4,1 бала.

Внесений до Реєстру сортів рослин, рекомендований для вирощування в зоні Степу.

ТРИТИКАЛЕ ЯРЕ

АРСЕНАЛ. Заявник – Приватне підприємство „Сорт”.

Кущ проміжної форми. Стебло середньої товщини, міцне. Листя світлозелене, велике за розміром без опушення та воскового нальоту. Колос білий, веретеноподібний, довгий, щільний. Колоскова луска ланцетна. Зубець гострий, короткий. Плече вузьке, скошене. Кіль гострий, середньо виражений. Остюки білі, короткі, середньорозлогі, зазубрені. Зернівка червона, овальнодовжена, крупна. Маса 1000 зерен 39,8 г.

Вегетаційний період 98 днів.

Рослини висотою 95-100 см.

Стійкість до вилягання 4,9 бала, до осипання 5,0 балів, до засухи 4,4 бала.

Основними хворобами уражувався слабо.

Середня урожайність сорту за роки випробування становила 42,6 ц/га.

Гарантована прибавка становила 2,33 ц/га. Вміст білку в зерні 12,5 %.

Внесений до Реєстру сортів рослин України, рекомендований для зони Полісся.

ВІКТОРІЯ. Заявник - Носівська селекційна дослідна станція, НВТ „Агро – Інтер”

Гексаплоїдний. Тип розвитку ярий. Сходи мають середнє антоціанове забарвлення. Кущ прямий. Стебло середньоросле, середньо виповнене, опушення середнє. Колос пониклий, білий, веретеноподібний, довгий, частково не вимолочуються верхівки. Остюки середньої довжини, коротші за колос, розташовані по всій його довжині, слабо розведені, світо – сірі. Зернівка червона, виповнена, пшеничного типу.

Рослини заввишки 97 см. Достигає за 97 днів, відноситься до середньостиглих сортів. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала, стійкість до засухи 8,1 бала.

Сорт слабо уражується борошнистою росою та бурюю іржею.

Середня урожайність сорту за роки випробування склала 38,2 ц/га.

Вміст білку в зерні 13,1 %. Маса 1000 зерен 37,6 г.
Внесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення по зоні Полісся.

ХЛИБОДАР ХАРКІВСЬКИЙ. Заявник – Інститут рослинництва УААН.

Гексаплоїдний. Тип розвитку ярий. Антоціанове забарвлення сходів середне. Куцц напівпрямий. Стебло середньоросле з дуже сильним опушенням шийки. Колос білий, довгий, середньої щільності. Остюки довгі, розташовані по всій довжині колоса. Зернівка червона, велика. Маса 1000 зерен 40,0 г.

Рослини висотою 114 – 117 см.

Середньостиглий, достигає за 96 -97 днів. Стійкість сорту до вилягання 7,6 бала. Стійкість до засухи 8,0 балів.

Сорт слабо уражувався борошнистою россою, стійкий до ураження бурою іржею та кореневими гнилями.

Урожайність сорту в середньому за роки випробування склала 36,6 ц/га. Вміст білку в зерні становить 12,9%.

ОВЕС

Ранньостиглий - Сорт виведений на Носівській селекційно-дослідній станції методом гібридизації.
Різновидність мутка.

Стебло середньої висоти 95-110 см, середньої товщини, міцне. Волоть напівстиснута, гілки відходять під гострим кутом до стрижня, жовтувата, завдовжки 18-19 см. Колоскові луски довгі з яскраво вираженою нервацією. Колоски здебільшого двозерні. Остюки практично відсутні.

Зернівка московського (пробштейського) типу, біла, добре виповнена. Маса 1000 насінин - 31-37г. Плівчастість нижче-середня - 23-24%. Основа нижньої зернівки опушена ріденькими волосками.

Сорт ранньостиглий - 86-90 днів, дозріває на 7-10 днів раніше стандартів.

Стійкість до осипання та вилягання висока. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали урожай 37,7-41,4 ц/га, максимальний - 64 ц/га. Слабко уражується корончатою іржею. Стійкий до летючої сажки. Шведською мухою пошкоджується на рівні стандартів.

Рекомендований для вирощування в зонах Полісся та Лісостепу.

Райдужний - Сорт виведений на Носівській селекційно-дослідній станції Інституту агроєкології та біотехнології УААН.
Виведений методом гібридизації. Різновидність мутка.