

### **Скарлет** - Заявник фірма Осева Прага с. р. о., Чехія. Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої щільності, солом'яно-жовтий, остистий, неламкий, слабо звужується до верхини.

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті.

Колоскова луска мала, вузька, тонка, без опушення.

Квіткова луска слабозморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна.

Кущ прямостоячий, листки зелені, опушення середнє.

Стебло міцне, висота рослин 75 – 80 см.

Зернівка жовта, еліптична. Маса 1000 зерен – 45-55 г.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 81-84 дні. Стійкий проти вилягання. За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 3,5-4 млн/га насінин.

Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на внесення мінерального живлення.

Пивоварні якості добрі. Білка має 10,0-11,5 %, пшівчастість 8-9 %, екстрактивних речовин 79-80 % . Високоврожайний. За роки випробування на державних сортопробувальних станціях отримали середній врожай 48,9 ц/га, що на 11,3 відсотки більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Бородянській державній сортопробувальній станції 85 ц/га.

Борознистою рослою уражується середньо. Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

### **Оболонь** - Виведений у Селекційно-генетичному інституті методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини (7 – 8 см), середньої щільності (10 – 11 члеників на 4 см колоскового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, слабо звужується до верхини. Колосовий стрижень опушений рідкими довгими волосками. Добра озерненість колоса (19 – 20 зерен в колосі).

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, солом'яно-жовті.

Колоскова луска мала, тонка, вузька, без опушення.

Квіткова луска зморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в остюк поступовий.

Основна щетина зерна довговолосяна.

Кущ напіврозлогий. Листки середньоопушені, вузькі, світло-зелені. Стійкий до вилягання, що забезпечується коротким (70 – 80 см) міцним стеблом. Сорт відзначається високою куцистістю.

Зернівка світло-жовта, тонкоплівчаста, подовжено-овальної форми. Маса 1000 зерен – 42-51 г.

Середньостиглий, дозріває за 81 – 85 днів. Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100 – відсоткової господарської придатності 4 – 4,5 млн/га насінин.

Запізнення із сівбою на 5 – 10 днів призводить до значного недобору врожаю (від 4 до 6 ц/га) та погіршення якості зерна.

Агротехніка – звичайна для зони вирощування. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 40,5 ц/га, що на 3,2 % більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Перемишлянській державній сортовипробувальній станції в 1999 році - 75 ц/га.

Має високі пивоварні властивості. Білка має 9,5 – 11,0 %, плівчастість 8 – 9, екстрактивність речовин - 78-80, крохмалю – 58-62 %. Стійкість проти хвороб і шкідників. Стійкість до всіх листостеблових хвороб, летючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу і Полісся.

**Гетьман** - Виведений у Селекційно-генетичному інституті для умов високоінтенсивного землеробства методом схрещування. Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини (6-8см), середньої щільності (12 члеників на 4 см колоскового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, слабо звужується до верхівки. Добра озерненість колоса (19 – 20 зерен в колосі), висока кущистість, вирівняність стеблостою.

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, солом'яно-жовті. В період колосіння мають антоціанове забарвлення. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. Квіткова луска слабозморшкувата, нервація добре виявлена. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Основна шетина зерна довголососяна.

Куш прямостоячий. Лист неопушений, проміжний, зелений.

Зернівка жовта, велика, подовжено-овальної форми. Маса 1000 зерен – 42-48г.

Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100 – відсоткової господарської придатності 4 – 4,5 млн/га насінин.

Середньостиглий, дозріває за 81 – 83 дні. Запізнення із сівбою на 5 – 10 днів призводить до значного недобору врожаю (від 3,8 – 6,4 ц/га) та погіршення якості зерна. Агротехніка – звичайна для зони вирощування.

За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 40,9 0 44,7 ц/га, що на 3,7 відсотків більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Миргородській державній сортовипробувальній станції в 1999 році - 80 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,8 %, плівчастість 8 – 9, екстрактивність речовин 78 – 80, крохмалю 58-62 %.

Стійкий до листостеблових хвороб, летючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу і Полісся.

**Інарі** - Заявник-фірма Бореаль, Фінляндія. Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини (7-9см), підвищеної щільності (11 – 12 члеників на 4 см колосового стрижня), неламкий, звужується до верхини, солом'яно-жовтий. Добра озерненість колоса (16-26 зерен в колосі).