

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, солом'яно-жовті.

Колоскова луска, тонка, вузька, без опушенння.

Квіткова луска слабкоморшкувата, нервація добре виявлене. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Зернівка жовта, еліптична.

Кущ напіврозлогий. Листки без опушенння, вузькі, темно-зелені.

Сорт інтенсивний. Добре реагує на внесення мінерального живлення. середньостиглий. Вегетаційний період коливається в межах 75 – 83 дні. Стійкий до вилягання. За даними заявитика рекомендується висівати за 100 – процентної господарської придатності 3,5-4,5 млн/га насінин. Агротехніка звичайна для зони вирощування.

За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 40,3 ц/га, що на 3,4 % більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Волинській державній сортовипробувальній станції в 2000 році - 75 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,2 %, плівчастість - 8-9, екстрактивність речовин - 78 – 80, крохмалю – 58-62 %.

Стійкість до хвороб і шкідників: сорт стійкий до смужкового гельмінтоспоріозу і твердої сажки.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Табора - Заявник - фірма Секобра Ремерш, Франція.

Виведений методом скрещування.

Різновидність нутанс.

Колос дворядний, середньої довжини (8 – 10 см), середньої щільності (10 – 11 члеників на 4 см колосового стрижня), неламкий, слабо звужується до верхівки, солом'яно-жовтий.

Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, жовті.

Колоскова луска мала, без опушенні.

Квіткова луска слабкоморшкувата, нервація добре виявлене, перехід в остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна.

Кущ розлогий, листки неопушенні, проміжні, зелені.

Висота рослин - 70-85 см.

Зернівка жовта, велика, подовженої форми. Маса 1000 зерен – 45-50 г.

Середньостиглий, дозріває за 81 – 83 дні.

Сорт інтенсивного типу. За даними заявитика рекомендується висівати за 100 – відсоткової господарської придатності 4 – 4,5 млн/га насінин.

Дуже реагує на запізнення із сівбою.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 38,2-44,9 ц/га, що на 4,6-9,6 % більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Андрушівській державній сортовипробувальній станції в 2000 році - 85 ц/га.

Має високі пивоварні властивості. Білка має 10,5 – 11,3 %, плівчастість – 8-9, екстрактивність речовин – 78-80, крохмалю 58 – 62 %.

Стійкість до хвороб та шкідників. Має комплексну стійкість до більшості поширеніх в Україні хвороб: летуючої, твердої і чорної сажки, борошнистої роси, гельмінтоспоріозу.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу, Полісся та Степу.

Зоряний - Виведений у Селекційно-генетичному інституті методом схрещування.

Різновидність – нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 членників), неламкий. Колосові луски середньої довжини, вузькі. Остюки довгі, гладенькі, зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Зернівка еліптична, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 42,1-45,5 г. Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 75-84 дні, на 2-3 дні раніше національних стандартів. Солома середньої довжини (67-81 см), міцна, стійка до вилягання.

Сорт інтенсивного типу, пластичний, стійкий до осипання.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до значного недобору врожаю (4,1-9,6 ц/га).

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 35,3-39,6 ц/га, що на 5,0-6,9% більше національних стандартів.

Потенційна можливість сорту – 95 ц/га. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,3-12,0%, плівчастість – 8-9, екстрактивних речовин 78-80, крохмалю – 58-62%.

Борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів. Обов'язкове протруювання насіння проти летуючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу і Полісся.

Донецький 14 - Виведений у Донецькому інституті агропромислового виробництва методом схрещування.

Різновидність – медикум. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 членників), довжина 11-14 см, слабко поникає, солом'яно-жовтий, циліндричної форми. Колосові луски вузькі. Остюки довгі (довші від колоса в 1,5-2 рази), зазубрені, еластичні. Квіткові луски лінійно-ланцетні, вузькі, середньої довжини, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Зернівка напіввидовжена, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 45,1-48,2 г.

Середньостиглий, вегетаційний період – 73-85 днів. Солома середньої довжини, - 58-62 см. Має підвищену стійкість до посухи.