

Агротехніка звичайна для зони вирощування. За роки випробування на державних сортопробувальних станціях отримали середній врожай 38,2-44,9 ц/га, що на 4,6-9,6 % більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Андріївській державній сортопробувальній станції в 2000 році - 85 ц/га.

Має високі пивоварні властивості. Білка має 10,5 - 11,3 %, плівчастість - 8-9, екстрактивність речовин - 78-80, крохмалю 58 - 62 %.

Стійкість до хвороб та шкідників. Має комплексну стійкість до більшості поширених в Україні хвороб: летючої, твердої і чорної сажки, борошнистої роси, гельмінтоспориозу.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу, Полісся та Степу.

Зоряний - Виведений у Селекційно-генетичному інституті методом схрещування.

Різновидність - нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), неламкий. Колосові луски середні довжини, вузькі. Остюки довгі, гладенькі, зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Зернівка еліптична, жовтого кольору, маса 1000 зерен - 42,1-45,5г. Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 75-84 дні, на 2-3 дні раніше національних стандартів. Солема середньої довжини (67-81 см), міцна, стійка до вилягання.

Сорт інтенсивного типу, пластичний, стійкий до осипання.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до значного недобору врожаю (4,1-9,6 ц/га).

На державних сортопробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 35,3-39,6 ц/га, що на 5,0-6,9% більше національних стандартів.

Потенційна можливість сорту - 95 ц/га. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,3-12,0%, плівчастість - 8-9, екстрактивних речовин 78-80, крохмалю - 58-62%.

Борошнистою росю, бурюю іржею, гельмінтоспориозом уражується нижче стандартів. Обов'язкове протруювання насіння проти летючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу і Полісся.

Донецький 14 - Виведений у Донецькому інституті агропромислового виробництва методом схрещування.

Різновидність - медуком. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 11-14 см, слабко поникає, солом'яно-жовтий, циліндричної форми. Колоскові луски вузькі. Остюки довгі (довші від колоса в 1,5-2 рази), зазубрені, еластичні. Квіткові луски лінійно-ланцетні, вузькі, середньої довжини, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Зернівка напівдовжена, жовтого кольору, маса 1000 зерен - 45,1-48,2г.

Середньостиглий, вегетаційний період - 73-85 днів. Солома середньої довжини, - 58-62 см. Має підвищену стійкість до посухи.