

Агротехніка звичайна для зони вирощування. За роки випробування на державних сортовипробувальних станціях отримали середній врожай 38,2-44,9 ц/га, що на 4,6-9,6 % більше стандартів.

Максимальний врожай сорту отримали на Андрушівській державній сортовипробувальній станції в 2000 році - 85 ц/га.

Має високі пивоварні властивості. Білка має 10,5 – 11,3 %, плівчастість – 8-9, екстрактивність речовин – 78-80, крохмалю 58 – 62 %.

Стійкість до хвороб та шкідників. Має комплексну стійкість до більшості поширеніх в Україні хвороб: летуючої, твердої і чорної сажки, борошнистої роси, гельмінтоспоріозу.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу, Полісся та Степу.

Зоряний - Виведений у Селекційно-генетичному інституті методом схрещування.

Різновидність – нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 членників), неламкий. Колосові луски середньої довжини, вузькі. Остюки довгі, гладенькі, зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий.

Зернівка еліптична, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 42,1-45,5 г. Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 75-84 дні, на 2-3 дні раніше національних стандартів. Солома середньої довжини (67-81 см), міцна, стійка до вилягання.

Сорт інтенсивного типу, пластичний, стійкий до осипання.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,0-4,5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до значного недобору врожаю (4,1-9,6 ц/га).

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 35,3-39,6 ц/га, що на 5,0-6,9% більше національних стандартів.

Потенційна можливість сорту – 95 ц/га. Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,3-12,0%, плівчастість – 8-9, екстрактивних речовин 78-80, крохмалю – 58-62%.

Борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів. Обов'язкове протруювання насіння проти летуючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу і Полісся.

Донецький 14 - Виведений у Донецькому інституті агропромислового виробництва методом схрещування.

Різновидність – медикум. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 членників), довжина 11-14 см, слабко поникає, солом'яно-жовтий, циліндричної форми. Колосові луски вузькі. Остюки довгі (довші від колоса в 1,5-2 рази), зазубрені, еластичні. Квіткові луски лінійно-ланцетні, вузькі, середньої довжини, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Зернівка напіввидовжена, жовтого кольору, маса 1000 зерен – 45,1-48,2 г.

Середньостиглий, вегетаційний період – 73-85 днів. Солома середньої довжини, - 58-62 см. Має підвищену стійкість до посухи.

За даними науково-дослідних установ рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Сорт добре кущиться, щільність стеблестою сягає 650-750 продуктивних стебел на 1м². Сорт раннього строку сіву. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 10 ц/га.

Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 33,3-40,5 ц/га. Потенційна можливість сорту – 79 ц/га.

Цінний, білка має 13,5-14,4%, вихід крупи складає 44,7%, вирівняність зерна – 94,5%.

Сорт стійкий до ураження бурою іржею. Обов'язкове протруювання насіння проти летуючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

Олбрам - Заявник – фірма Осева Прага с.р.о., Чехія. Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 членників), довжина 8-9 см, слабо поникає. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора-два рази. Квіткові луски не мають забарвлення, з маленькими зубчиками. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зерна волосиста.

Зерно еліптично-ромбічне, жовте, крупне. Маса 1000 зерен 41-42г. Рослини середньої висоти, за стійкістю проти вилягання дещо перевищують стандарти.

Середньопізня, дозріває за 79-90 днів. Солома середньої довжини (63-65 см), міцна.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору до 10 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною кущистістю та раннім строком сіву.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 35,6-48,4 ц/га. Потенційна можливість сорту – 85 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,1-11,3%, плівчастість 7-8, екстрактивних речовин – 80-82, крохмалю – 58-62%.

Борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом та летуючою сажкою уражується на рівні стандартів.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Потос - Виведений на Вінницькій державній сільськогосподарській дослідній станції методом гібридизації.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, середньої довжини (6-7 см), нещільний, колоскові луски вузькі. Остюки довгі (довші колоса в 2 рази), тонкі, еластичні, зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі,