

За даними науково-дослідних установ рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин. Сорт добре кущиться, щільність стеблестою сягає 650-750 продуктивних стебел на 1 м². Сорт раннього строку сіву. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 10 ц/га.

Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 33,3-40,5 ц/га. Потенційна можливість сорту – 79 ц/га.

Цінний, білка має 13,5-14,4%, вихід крупі складає 44,7%, вирівняність зерна – 94,5%.

Сорт стійкий до ураження бурю іржею. Обов'язкове протруювання насіння проти летючої сажки. Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

Олбрам - Заявник – фірма Осев Прага с.р.о., Чехія. Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 8-9 см, слабо поникає. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора-два рази. Квіткові луски не мають забарвлення, з маленькими зубчиками. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зерна волосиста.

Зерно еліптично-ромбічне, жовте, крупне. Маса 1000 зерен 41-42г. Рослини середньої висоти, за стійкістю проти вилягання дещо перевищують стандарти.

Середньопізній, дозріває за 79-90 днів. Солома середньої довжини (63-65 см), міцна.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору до 10 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною кущистістю та раннім строком сіву.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 35,6-48,4 ц/га. Потенційна можливість сорту – 85 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,1-11,3%, плівчастість 7-8, екстрактивних речовин – 80-82, крохмалю – 58-62%.

Борошнистою росюю, бурюю іржею, гелмінтоспоріозом та летючою сажкою уражується на рівні стандартів.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Лотос - Виведений на Вінницькій державній обласній сільськогосподарській дослідній станції методом гібридизації.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, середньої довжини (6-7 см), нещільний, колоскові луски вузькі. Остюки довгі (довші колоса в 2 рази), тонкі, еластичні, зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі,