

За даними науково-дослідних установ рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин. Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Урожайний. На державних сортопробувальних станціях та дільницях отримали середній врожай 38,5 ц/га, максимальний – 69,8 ц/га – на Тернопільській державній сортопробувальній станції.

Білка має 12,2%, вихід крупи – 44,4%, вирівняність зерна – 95,2%.

Слабо уражується борошністою росюю та карликовою іржею. Стійкий до ураження летючою сажкою. Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Корона - Заявник – науково-дослідна комерційно-виробнича фірма “Мир-Сем”. Виведений методом індивідуального добору.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, середньої довжини (8-9 см), слабо звужується до верхівки, середньої щільності. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у півтора-два рази. Зерно середнього розміру, еліптичної форми. Маса 1000 насінин – 42,7-45,4г. Рослини середньої висоти, досить стійкі до вилягання. Куштістість висока. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста. Середньоранній, достигає за 74-80 днів, на 4-5 днів раніше стандартів.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин.

Належить до сортів інтенсивного типу, за сприятливих умов здатний давати більше 75-80 ц/га.

Відрізняється стійкістю до весняних заморозків, добре використовує осадки другої половини вегетації.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,5-11,2 відсотка, півчастість – 8-9 відсотків, екстрактивних речовин – 79-81 відсоток.

Стійкий до борошністої роси, гелмінтоспориозу, летючої сажки.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

СН-28 - Виведений на Кіровоградській державній обласній станції методом схрещування.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, середньої щільності, довжиною 6-9 см, слабо поникає, ромбічної форми. Остюки довгі (довші колоса в 1,5 раза), зверху слабо зазубрені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Основна щетинка довговолосиста.

Середньостиглий, достигає за 76-84 дні. Солома середньої довжини (63-68 см), міцна. Стійкий до вилягання та осипання. Має підвищену стійкість до посухи. Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 12 ц/га.

Сорт напівінтенсивного типу, пластичний.

Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.