

Летючою сажкою та борошнистою росою уражується середньо. Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Тюрінгія - Заявник фірма Заатен-Уніон ГмбХ. Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос веретеноподібної форми, дворядний, нещільний, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня – 10-11 члеників), довжина 7-9 см, слабо поникає, ромбічної форми, не ламається. Колоскова луска тоненька, ніжна, має густе довговолосисте опушення. Остюки солом'яно-жовті, довгі, слабо розходяться, тоненькі, ніжні, сильно зазубрені. Квіткова луска ніжна, зморшквата, нервация добре виражена, перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки довговолосиста. Зернівка еліптична, жовта, велика. Маса 1000 зерен – 44,1-46,8г.

Середньостиглий, дозріває за 76-83 дні.

Солома середньої довжини (65-68 см), міцна, стійка до полягання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 3,5-4,0 млн/га насінин.

Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 9 ц/га.

Сорт інтенсивного типу.

Пивоварні якості добрі. Білка має 10,3-11,7%, пшівчастість – 8-10%, екстрактивних речовин – 79-81%.

Летючою сажкою та борошнистою росою уражується середньо.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Галактик - Виведений у Селекційно-генетичному інституті методом індивідуального добору.

Різновидність – нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), довжина 11-12 см, слабо поникає, неламкий. Колосові луски вузькі. Остюки довгі, паралельні, зазубрені, еластичні. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка зернівки довговолосиста. Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 зерен - 46,9-50,9г. Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 72-87 днів, на 1-2 дні раніше національних стандартів. Солома середньої довжини (72-87 см), міцна, стійка до вилягання.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється стійкістю до весняних заморозків, високим температурам і засусі в літній період. Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації.

За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до незначного недобору врожаю (від 3,6- до 8,6 ц/га).

Сорт інтенсивного типу, пластичний, стійкий до осипання.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 35,3-40,1 ц/га, що на 3,6-11,9