

Летючою сажкою та борошнистою росю уражується середньо.
Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Тюрінгія - Заявник фірма Заатен-Уніон Гмбх. Виведений методом схрещування.

Різновидність нутанс. Форма куща прямостояча. Колос веретеноподібної форми, дворядний, нещільний, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня – 10-11 члеників), довжина 7-9 см, слабо поникає, ромбічної форми, не ламається. Колоскова луска тоненька, ніжна, має густе довговолосисте опушення. Остюки солом'яно-жовті, довгі, слабо розходяться, тоненькі, ніжні, сильно зазубрені. Квіткова луска ніжна, зморшкувата, нервація добре виражена, перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки довговолосиста. Зернівка еліптична, жовта, велика. Маса 1000 зерен – 44,1-46,8г.

Середньостиглий, дозріває за 76-83 дні.

Солома середньої довжини (65-68 см), міцна, стійка до полягання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 3,5-4,0 млн/га насінин.

Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 9 ц/га.

Сорт інтенсивного типу.

Пивоварні якості добрі. Білка має 10,3-11,7%, плівчастість – 8-10%, екстрактивних речовин – 79-81%.

Летючою сажкою та борошнистою росю уражується середньо.

Рекомендований для вирощування у зоні Полісся.

Галактик - Виведений у Селекційно-генетичному інституті методом індивідуального добору.

Різновидність – нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня припадає 12-14 члеників), довжина 11-12 см, слабо поникає, неламкий. Колосові луски вузькі. Остюки довгі, паралельні, зазубрені, еластичні. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Добре помітна перша пара квіткової луски. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка зернівки довговолосиста. Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 зерен - 46,9-50,9г. Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 72-87 днів, на 1-2 дні раніше національних стандартів. Солома середньої довжини (72-87 см), міцна, стійка до вилягання.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється стійкістю до весняних заморозків, високим температурам і засусі в літній період. Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації.

За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до незначного недобору врожаю (від 3,6- до 8,6 ц/га).

Сорт інтенсивного типу, пластичний, стійкий до осипання.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 35,3-40,1 ц/га, що на 3,6-11,9

відсотків більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту - 85 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,2-12,4%, плівчастість 8-9, екстрактивних речовин - 77-79, крохмалю - 58-62%.

Борошнистою россою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом та летючою сажкою уражується нижче або на рівні стандартів.

Рекомендований для вирощування у всіх природно-кліматичних зонах.

Джерело - Виведений в інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва.

Різновидність – медікум.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня 10-11 члеників), довжина 6-9 см, слабо поникає, солом'яно-жовтого кольору, ромбічної форми. Остюки довгі (довші колоса в 1,5 раза), вгорі слабо зазубрені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетина довговолосиста. Зернівка еліптична, нижня частина трохи вкорочена і розширена, жовтого кольору, маса 1000 зерен - 43-49г. Середньостиглий, вегетаційний період 70-85 днів. Солома середньої довжини (73-75 см), міцна, стійка до вилягання.

За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Запізнення з сівбою на 5-10 днів, призводить до недобору врожаю 2,3-7,1 ц/га. Сорт напівінтенсивного типу, пластичний, стійкий до осипання.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 39,5-39,9 ц/га, що на 5,2-8,1 відсотка більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту 90 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,7-12 відсотків, плівчастість 8-10, екстрактивних речовин 79, крохмалю 58-60 відсотків.

Стійкий до ураження борошнистою россою, бурою іржею; гельмінтоспоріозом уражується слабо.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу і Полісся.

Бадьорий - Виведений в інституті рослинництва ім.Юр'єва.

Різновидність – нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, нещільний, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня 10-11 члеників), довжина 7-10 см, слабо поникає, ромбічної форми. Остюки солом'яно-жовті, довгі, вгорі слабо зазубрені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху. Квіткові луски дрібно-зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста. Зернівка еліптична, нижня частина трохи вкорочена і розширена, жовтого кольору, маса 1000 зерен - 45,1-45,9 г.

Сорт середньостиглий, дозріває за 71-86 днів. Солома середньої довжини (72-74 см), міцна, стійка до полягання.

За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насінин.