

відсотків більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту - 85 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 11,2-12,4%, пшівчастість 8-9, екстрактивних речовин - 77-79, крохмалю - 58-62%.

Борошнистою росолою, бурою іржею, гельмінтоспориозом та летючою сажкою уражується нижче або на рівні стандартів. Рекомендований для вирощування у всіх природно-кліматичних зонах.

Джерело - Виведений в інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва. Різновидність - медікум.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, солом'яно-жовтий, нещільний (на 4 см колосового стрижня 10-11 члеників), довжина 6-9 см, слабо поникає, солом'яно-жовтого кольору, ромбічної форми. Остюки довгі (довші колоса в 1,5 раза), вгорі слабо зазубрені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху. Квіткові луски зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетина довговолосиста. Зернівка еліптична, нижня частина трохи вкорочена і розширена, жовтого кольору, маса 1000 зерен - 43-49г. Середньостиглий, вегетаційний період 70-85 днів. Солома середньої довжини (73-75 см), міцна, стійка до вилягання.

За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати за 100-відсоткової придатності 4,5-5 млн/га насінин.

Запізнення з сівбою на 5-10 днів, призводить до недобору врожаю 2,3-7,1 ц/га. Сорт напівінтенсивного типу, пластичний, стійкий до осипання.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 39,5-39,9 ц/га, що на 5,2-8,1 відсотка більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту 90 ц/га.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка має 10,7-12 відсотків, пшівчастість 8-10, екстрактивних речовин 79, крохмалю 58-60 відсотків.

Стійкий до ураження борошнистою росолою, бурою іржею; гельмінтоспориозом уражується слабо. Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу і Полісся.

Бадьорий - Виведений в інституті рослинництва ім.Юр'єва.

Різновидність - нутанс. Форма куща прямостояча. Колос дворядний, нещільний, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня 10-11 члеників), довжина 7-10 см, слабо поникає, ромбічної форми. Остюки солом'яно-жовті, довгі, вгорі слабо зазубрені, зубчики розміщені по обох краях від основи до верху. Квіткові луски дрібно-зморшкуваті, лінійно-ланцетні, тоненькі, добре помітна зазубреність першої пари нервів. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка довговолосиста. Зернівка еліптична, нижня частина трохи вкорочена і розширена, жовтого кольору, маса 1000 зерен - 45,1-45,9 г.

Сорт середньостиглий, дозріває за 71-86 днів. Солома середньої довжини (72-74 см), міцна, стійка до полягання.

За даними науково-дослідних установ, рекомендується висівати за 100-відсоткової придатності 4,5-5 млн/га насінин.