

Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4,5-5 млн/га насіння. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 8 ц/га.

Сорт напівінтенсивного типу, пластичний. Стійкий до весняних заморозків. Здатний в умовах Степу забезпечувати врожай 53-64 ц/га.

Цінний. Має відмінні круп'яні якості. Білка має в зоні Степу – 13,6%, вихід крупи – 44,4%, високу вирівняність зерна – 97,3%. Борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів.

Рекомендований для вирощування у зонах Степу та Лісостепу.

Невада - Заявник – фірма Секобра, Франція.

Виведений методом скрещування. Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, середньої щільності, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня 11-13 членників), довжина 7-9 см, слабо поникає, не ламається.

Колоскова луска тоненька. Остюки солом'яно-жовті, довгі, слабко розходяться, сильно зазубрені. Квіткова луска ніжна, зморшкувата, нервація добре виражена, перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки довговолосиста. Зернівка еліптична, жовта, велика. Маса 1000 зерен – 45,1 г.

Середньоранній, дозріває на 3-4 дні раніше стандартів, – за 72-79 днів. Солома (58-59 см) міцна, стійка до вилягання та осипання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4- 4,5 млн/га насіння. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 11 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на повне внесення мінерального живлення. Пивоварні якості добри. Білка має 10,7-11,4%, плівчастість – 8-9%, екстрактивних речовин 79-81%.

Високоврожайний. На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали середній врожай 39,9-42,1 ц/га, максимальний на Бородянській державній сортовипробувальній станції – 88,7 ц/га. Летуючу сажкою та борошнистою росою уражується середньо.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Пеяс - Заявник – фірма Осева Прага с.р.о., Чехія.

Виведений методом скрещування. Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос веретеноподібної форми, дворядний, нещільний, солом'яно-жовтий (на 4 см колосового стрижня 11-12 членників), довжина 7-9 см, слабо поникає, не ламається. Остюки солом'яно-жовті, довгі, слабко розходяться, тоненькі, ніжні.

Квіткова луска зморшкувата, нервація добре виражена, перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетинка біля основи зернівки довговолосиста. Зернівка еліптична, жовта. Маса 1000 зерен – 43,4 г.

Середньостиглий, дозріває за 76-81 день. Солома середньої довжини 59-63 см, міцна, стійка до полягання та осипання.

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 9 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на внесення повного мінерального живлення. Пивоварні якості добре. білка має 11,4-11,9%, плівчастість 8-10%, екстрактивних речовин до 82%.

Високоврожайний. На Верхівській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 81,7 ц/га. Летуючою сажкою та борошнистою росою пошкоджується слабо.

Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Толар - Заявник – фірма Осева Прага с.р.о., Чехія.

Виведений методом індивідуального добору. Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 7-8 см, слабо поникає. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у 1,5 рази. Квіткові луски не мають забарвлення. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетина біля основи зерна волосиста.

Зерно еліптично-ромбічне, жовте, крупне. Маса 1000 зерен – 45,3г.

Рослини середньої висоти, стійкі до осипання.

Середньостиглий, дозріває за 76-83 дні. Солома середньої довжини – 66см, міцна.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 12 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добре результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною кущистістю та більш раннім строком сіву.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 46,5 ц/га. Відноситься до сортів пивоварного напрямку. білка має 11,2%, плівчастість 8-10%, екстрактивних речовин 80-81%.

Борошнистою росою, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Целінка - Заявник – фірма Флорімонд Депре, Франція.

Виведений методом скрещування. Форма куща прямостояча.

Колос дворядний, солом'яно-жовтий, завдовжки 6-8см, середньої щільності. Остюки довгі (довші від колоса в 1,5 раза), слабко зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка зернівки довговолосиста. Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 зерен 43,9г.

Середньостиглий, вегетаційний період коливається в межах 72-88 днів, на 1-3 дні раніше стандартів. Солома середньої довжини - 62,1-69,7 см, міцна, стійка до вилягання.