

За даними заявника, рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин. Запізнення із сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 9 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на внесення повного мінерального живлення. Пивоварні якості добрі. Білка має 11,4-11,9%, плівчастість 8-10%, екстрактивних речовин до 82%.

Високоврожайний. На Верхівській державній сортовипробувальній станції отримали врожай 81,7 ц/га. Легкою сажкою та борошністою росю пошкоджується слабо. Рекомендований для вирощування у зонах Лісостепу та Полісся.

Толар - Заявник – фірма Осева Прага с.р.о., Чехія.

Виведений методом індивідуального добору. Різновидність нутанс.

Форма куща прямостояча. Колос дворядний, злегка звужується до верхівки, середньої щільності (на 4 см колосового стрижня 12-14 члеників), довжина 7-8 см, слабо поникає. Остюки довгі, ніжні, перевищують довжину колоса у 1,5 рази. Квіткові луски не мають забарвлення. Перехід квіткової луски в остюк поступовий. Щетина біля основи зерна волосиста.

Зерно еліптично-ромбічне, жовте, крупне. Маса 1000 зерен – 45,3г.

Рослини середньої висоти, стійкі до осипання.

Середньостиглий, дозріває за 76-83 дні. Солома середньої довжини – 66см, міцна.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 4-4,5 млн/га насінин. Запізнення з сівбою на 5-10 днів призводить до недобору врожаю до 12 ц/га.

Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

Особливістю сорту є те, що він відрізняється підвищеною кущистістю та більш раннім строком сіву.

На державних сортовипробувальних станціях та дільницях за роки випробування отримали урожай 46,5 ц/га. Відноситься до сортів пивоварного напрямку. Білка має 11,2%, плівчастість 8-10%, екстрактивних речовин 80-81%.

Борошністою росю, бурою іржею, гельмінтоспоріозом уражується нижче стандартів.

Рекомендований для вирощування у зоні Лісостепу.

Целінка - Заявник – фірма Флорімонд Депре, Франція.

Виведений методом схрещування. Форма куща прямостояча.

Колос дворядний, солом'яно-жовтий, завдовжки 6-8см, середньої щільності. Остюки довгі (довші від колоса в 1,5 раза), слабо зазубрені. Квіткові луски лінійно-ланцетні, тоненькі, зморшкуваті. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, основна щетинка зернівки довговолосиста. Зернівка видовжено-овальної форми, жовтого кольору, маса 1000 зерен 43,9г.

Середньостиглий, вегетативний період коливається в межах 72-88 днів, на 1-3 дні раніше стандартів. Солома середньої довжини - 62,1-69,7 см, міцна, стійка до вилягання.